STIRPIUM ORIENTALIUM.

RARIORUM

CATALOGI TRES.

Stirpium Orientalium exoticarum Catalogus,

praecipuas Graeciae, & Syriae, provincias incolentium.

A.

Acacia foliis inferis Metapotamicis Cod. dupl. in Recentiore Nova Hayn. Arabic. A cacia simplex Metapotamica, minutissimis foliis, filiqua integra contorta, juxta Tigridem fluvium in Metopotamia, & Babylonem in Arabia deserta.

Agratum Perficum RAJORUM.

Alsagi Maurorum Rauwolf. Genista spartium spinosum foliis Polygoni C. B. Spinosum Syriacum Park. Theatr. Alsagi Maurorum Alpin. Exot. Spinosa Syriaca tenuifolia Tournef. Cor.

Stirpium Orientalium rariorum Catalogus, præſertim Græciæ, & Syriæ, provinciis naſcentium.

A.

ABrotanum fœmina verum Dioſcoridis *Zanoni v.* Heliochryſum Abrotani fœminæ facie.

Acaciæ foliis frutex Meſapotamicus *Col. Annot.* in Res medicas *Novæ Hiſp. Recchi.* A caciæ ſimilis Meſopotamica, minutiſſimis foliis, ſiliqua integra contorta, craſſa & obtuſa, ſeu ſiliquæ Nabathæa *Breyn. Prod.* 2. Juxta Tigridem fluvium in Meſopotamia, & Euphratem in Arabia deſerta.

Ageratum Perſicum *Breyn. Prod.* 2.

Alhagi Maurorum *Rauwolf.* Geniſta ſpartium ſpinoſum foliis Polygoni *C. B.* Spinoſum Syriacum *Park.* Agul & Alhagi Arabibus, planta ſpinoſa Mannam reſipiens *J. B.* Manna in hac arbuſcula invenitur *Tereniabin* aut *Trungibin* Arabibus dicta. In Perſia & circa Halepum. *Rauw.* p. 84. 152. 206.

Alcea Indica parvo flore *C. B.* Ægyptia *Cluſ.* Ægyptiaca *Ger. emac.* Bamia *J. B.* Bamia ſeu Alcea Ægyptia *Park. parad.* Trionum Theophraſti *Rauwolf. Lugd. app.* Non in Ægypto tantum ſed etiam in Syria invenitur. *Rauwolf,* p. 167.

Alcea arboreſcens Syriaca *C. B.* Althæa arboreſcens glabra, Ketmia dicta *J. B.* Althæa frutex 2 *Cluſ.* Frutex flore albo vel purpureo *Park. Rauwolf.* p. 54. Circa Tripolin Syriæ obſervavit.

Androſæmum Conſtantinopolitanum fore maximo *Wheeler.* Flore & theca quinque capſulari omnium maximis *Moriſ. Hiſt.* p. 473. Non eſt hoc Aſcyron magno flore *C. B. prod.* Notæ enim non conveniunt. Circa Conſtantinopolin, eundo inde ad Pontum Euxinum, ſecus vias, & alibi copiosè.

Anemone

Anemone maxima Chalcedonica *Park.* Latifolia maxima verſicolor *C. B.* Maxima Chalcedonica polyanthos *Ger.* Latifolia pleno flore 1 *Cluſ.*

Anetho ſimilis planta ſemine lato laciniato *J. B.* Gingidium folio Fœniculi *C. B.* Verum, ſive Syriacum *Park.* Dioſcoridis *Rauwolf. Lugd. ap.* In monte Libano, locis præruptis, p. 234.

Anonis lutea annua ſiliqua glabra breviore *Moriſ. Hiſt.* Halepo tranſmiſit D. *Rob. Huntington.*

Apocynum folio ſubrotundo *C. B.* Folio rotundo, flore ex albo palleſcente *J. B.* Latifolium non repens *Park.* Periploca latifolia *Ger.* Syriæ & calidiorum regionum incola eſſe dicitur.

Apocynum repens & ſcandens *Rauwolf.* Monte Libano obſervavit Autor Itin. p. 233. Arbores tegit ut Ephedra.

Arbutus (Κόμαρος) Dioſcoridis vera *Wheeleri.* Folio non ſerrato *C. B.* Adrachne *Park.* Adrach. Theophraſti *J. B.* Ἀδράχλα Græcis modernis, *Bellonius* multis locis in ſua peregrinatione obſervavit. D. *Wheelerus* in Achaia prope montem Pentelicum.

Ariſarum anguſtifolium *Wheeleri* itiner. p. 309. Caule foliolo pingitur. Propè Panthæam inter Amphiſſam & Naupactum.

Ariſtolochia Maurorum *C. B.* Peregrina Rauwolfii *Cluſ.* Rhafut & Rumigi à Mauris nominata *Rauwolf. Lugd. app.* Ariſtolochiis ſimilis *Rhaſut* & *Rumigi* Maurorum *J. B.*

Ariſtolochia clematitis Attica, foliis in ſummo bifidis ſeu crenatis *Wheeleri.* Θερώκαλο Græcis. In monte Hymetto.

Arum auriculis longis, Ovidne dictum, Chalepenſe *Rauwolf.* p. 104.

Aſter luteus anguſtifolius *Park. J. B.* Luteus Linariæ rigido glabro folio *C. B.* 6 Cluſii *Ger.* In monte Olympo Aſiæ. *Wheel.*

Aſtragalus Syriacus hirſutus *C. B.* Syriacus *Lob. Ger. Park. J. B.* Aſtrag. Dioſcoridis, vulgò Chriſtiana radix *Rauwolf. Ludg. app.* p. 105. D. *Wheelerus* Itin. p. 435. Aſtragalum quendam deſcribit & depingit, quem in Græcia propè Megaram invenit, & argenteum vocat. Qu. An Syriacus ſit?

Atractylis Cypria *Ang. Lugd.* Purpurea *C. B.* Purpurea Cypria *Park.* Atractylis

Atractylis vera Antiquarum, cujus caulibus profusis utuntur mulieres Græcæ *D. Covel.* An Atractylidi & Cnico sylvestri similis *C. B.* Calochierny carduus Cretensibus *J. B.* In Thracia prope Constantinopolin. *V. Hist. nost.* p. 304.

Avellana Byzantina *J. B.* Pumila Byzantina *Clus. Ger. emac.* Peregrina humilis *C. B.* Nux Avellana Macedonica seu Byzantina *Park.*

Azadirachta foliis ramosis majoribus Syriaca, seu vulgaris flore majore cœruleo *Breyn.* Azedareth arbor, Fraxini folio, flore cœruleo *C. B.* Azadaracheni arbor *J. B.* Azadarach. Avicennæ *Park.* Zizipha alba *Ger.* Fructus hujus arboris venenatus est, & canes interficit. *Rauwolf.* p. 51. In Syriâ & Palestinâ.

B.

Baccharis Dioscoridis Rauwolfio *Park.* Gnaphalio montano affinis Ægyptiaca *C. B.* Rauwolfius in Syria observavit, & Monte Libano, *Itin.* p. 233.

Balsamum verum *J. B.* Genuinum Antiquorum *Park.* Rutæ folio, Syriacum *C. B.* Balsamum Alpini *Ger. emac.* Bellonius & Alpinus Arabiam Fælicem Balsami locum patrium semper fuisse, nunquam Judæam aut Ægyptum, contendunt.

Behmen abiad, i. e. Ben album *Rauwolffii Park.* Serratulæ affinis capitulo squamoso luteo, ut & flore *C. B.* Ad pedem montis Libani humido & umbroso loco, p. 235.

Bellis Chalepensis præcox *Kusan & Surugen* dicta *Rauwolf.* p. 109.

Borago variegata Cretica *Wheel.* Muralis variegata flore odorato Cretica *Zanoni.* In monte Hymotto Atticæ. Folia maculis albis variegata sunt: flores (qui candidi) maculis & striis purpureis cæruleisve.

C.

Calamus aromaticus Syriacus vel Arabicus suppositius *Park.* Syriacus *C. B. prod.* A Paludano ex Ægypto reduce habuid *C.* Bauhinus.

Camarronum Rhasis *Rauwolf. v.* Tithymalus.

Capparis arborescens fructu Juglandis magnitudine *C. B.* Arabica non spinosa *Park.* Cappares arborescentes *J. B.* In Arabia observavit Bellonius, Obs. l. 2. c. 20.

Castanea

Caſtanea equina *Ger. Park.* Equina folio multifido *J. B.* Folio multifido *C. B.* Conſtantinopoli & in Creta naſci fertur: certè Conſtantinopoli ad nos tranſmiſſa eſt.

Catanance Dioſcoridis *Rauwolf.* eſt plantago quinque nervia cum globulis albis piloſis *J. B.* Conſule Breynii Prod. 2. in Plantago.

Caucalis Syriaca cum maximo ſemine *J. B.* Gingidium latifolium *Ger.* Latifolium Syriacum *Park.* Foliis Paſtinacæ latifoliæ *C. B.* Semen ex Syria allatum J. Bauhino Rauwolfius communicavit.

Cedrus magna conifera Libani *Park.* Magna ſive Libani, conifera *J. B.* Conifera folio Laricis *C. B.* In monte Libani, ubi ſponte oritur, 24 tantùm arbores ſupputavit *Rauwolffius*, nec plures *Melchior Luſſy*, aſt *Bellonius*, qui non multo antea peregrinatus eſt, circiter 28, qui & in Amano & Tauro montibus ſe Cedros obſervaſſe ſcribit; ut Libano propriæ & peculiares non ſint. V. *Rauwolf.* p. 229.

Cedrus Lycia retuſa dicta & nonullis Cedrus Phœnicia, Galliæ etiam & Germaniæ communis eſt. *V.* Cat. general.

Charnubi Arab. i. e. Siliqua, p. 21. V. Synonyma in *Cat. gen.*

Chomæleon niger Dioſcorides *Rauwolf.* p. 51. 233.

Chondrilla altera Dioſcoridis *Rauwolf.* p. 106. *Cluſ.* Conyza marina *Lugd. C. B. J. B.* At noſtro judicio deſcriptio Rauwolfii illi non convenit.

Chondrillæ alterius aliud genus *Rauwolf.* aliud genus Dioſcoridis *Lugd.* Bulboſa, Conyza facie major, foliis latioribus *C. B.* Bulboſa altera latiore folio *Park.* Qui præcedentem bulboſam Syriacam anguſtifoliam vocat. Utramque invenit Rauwolfius circa Halepum Syriæ, alteram in arvis, alteram in locis ſaxoſis, p. 106.

Chryſocome vera. Dioſcoridis *Zanoni*, Helichryſum Perſicum nonnullis.

Chryſocome Syriaca candidiſſimis floribus *Breyn. cent.* In ſaxoſis Libani montis *Rauwolf.* herbar. ſicc. Gnaphalium *Rauwolf.* p. 232.

Chryſogonum Dioſcoridis, *Rauwolf. Lugd. app.* Quibuſdam *J. B. Ponæ Ital.* Leontopetalo affinis foliis quernis *C. B.* In Syria ſegetes *Rauwolf.* p. 108.

Ciſtus

Ciſtus folliis maurinis. In Olympo Aſiæ monte obſervavit *Wheelerus* 4. Invenitur prope Monſpelium & in Hiſpania. V. *Cat. Gen.*

Clinopodium Dioſcoridis *Rauwolf.* 52.

Cneorum *Matth.* In Hymetto Atticæ Monte invenit *Wheelerus.*

Colchicum Fritillaricum Chienſe *Park.* Variegatum *Cornut.*

Convolvulus Hederæ foliis *Rauwolf. Itin.* p. 113. Cæruleus Hederaceo anguloſo folio *C. B.* Trifolius ſ. hederaceus pupureus *Park.* Cæruleus *Ger.* Nil Arabum quibuſdam ſ. Convolvulus cæruleus *J. B.* Halepi in hortis.

Convolvulus purpureus folio ſubrotundo *C. B.* Cæruleus major rotundifolius *Park. parad.* Cæruleus folio ſubrotundo *Ger. emac.* Campanula Indica *J. B.* Ex Syria & Orientalibus delatum aiunt.

Convolvulus Sagittariæ foliis flore amplo purpureo *Wheeleri.* Zacynthi ad puteos bituminoſos.

Convolvulus Marinus Soldanellæ affinis *J. B.* Soldanella maritima major *Park.* Soldanella vel Braſſica maritima major *C. B.* Braſſicæ maritimæ genus *Rauwolf.* p. 47. *Ludg. app.* In Syria circa Tripolin. Folia in ſummo bifida ſunt ſeu crenata.

Convolvulus Arabicus ſeu Ægyptius *Alpin. exot.* 186. *Park.* Hujus ſemen ex Ægypto accepit Pr. Alpinus Convolvuli Arabici nomine.

Conyza Syriæ quibuſdam *J. B.* Minor *Rauwolfii. Park.* Major altera *C. B.* Circa Tripolin Syriæ obſervavit *Daſſylycus.* Conyza Dioſcoridis *Rauwolf.* p. 48.

Conchorus Plinii *C. B.* Conchorus ſive Melochia *J. B.* In hortis Halepi *Rauwolf.* p. 67. v. *Cat. Ægypt.*

Coris foliis criſpis montis Olympi Aſiæ *Wheeler* p. 220. An Hypericum foliis parvis criſpis ſeu ſimulatis Siculum *Hiſt. noſt.* p. 1018.

Coris legitima *Cluſ.* Hypericoides quorundam *J. B.* In Hymetto Atticæ monte *Wheeler.* v. *Cat. Cret.*

Corona Imperialis *Ger. Park.* Cor Imper. ſive Tuſai aliis *J. B.* Lilium ſive Corona Imperialis *C. B.* Hujus bulbos ex Perſia primò Conſtantinopolin delatos ſibi perſuadet Cluſius, quoniam cum eos primùm accipiebat, inter reliquas hæc fuit Inſcriptio, *Tuſai fior Perſiano roſſo o diſcolorito con la Teſta abaſſo.* h. e. Tuſai flos Perſicus ruber aut decolor nutante Capite.

Cyanus floridus odoratus Turcicus major & minor *Park.* Variat floris colore albo.

Cyanus floridus odoratus Turcicus latifoliis laciniatus *Hort. Pariſ.*

Cyanus Orientalis alter ſeu Conſtantinopolitanus flo. fiſtuloſo candicante *Hort. Reg. Par.*

Cyclamen Antiochenum autumnale flore purpureo duplici *Park.*

Cyclamen Autumnale, folio ſubrotundo, locido molliore & crenato, ſuave-rubente flore, Syriacum *Hort. Reg. Par.*

Cyclamen hyemale, orbiculatis foliis, inferius rubentibus purpuraſcente flore. Coum Herbariorum *Ejuſdem.*

Cycl. hyeme & vere florens, folio anguloſo, amplo flore albo, baſi purpurea, Perſicum dictum *Ejuſdem.*

Cycl. Autumnale, orbiculato, circumroſo folio, ſubtus rubente, odoratiſſimo flore *Ejuſdem.*

Cyperus rotundus odoratus Syriacus major *Park.* Orientalis major vel Babylonius *Rauwolf.* Rotundus orientalis major *C. B.* Rotundus Syriacus *Ger. emac.* Syriaca & Cretica rotundior *J. B.* In Babylonia circa urbem *Bagadet* muſcoſis humidis copioſè *Rauwolf.* In *Ægypto*, locis paludoſis *Alpin.*

Cyperus rotundus Orientalis minor *C. B.* Rotundus odoratus Syriacus minor *Park.* Minor Creticus *Ger. emac.* In Syriæ montoſis udis. Reperitur etiam in Italia.

Cytiſus folio argenteo montis Olympi *Wheeler.*

D. Dau-

D.

Daucus Tertius Dioſcoridis Rauwolf. p. 105. Folio Coriandri, flore luteo *J. B. v.* Cat. Cret. Halepi in colle quodam juxta fluvium obſervavit Rauwolfius. Radices *Zarneb Melchi* Turcis dicuntur.

Dictamnus Origani foliis Montis Stipuli *Flo. Bat. fl.* Origanum ſpicatum montis Sipyli foliis glabris *Hiſt. noſt.* In monte Sipylo copioſè *Wheeler itin.*

Draba Chalepenſis repens humilior, foliis minus cinereis & quaſi viridibus *Moriſ. Hiſt. D. Huntingdon.* Hujus ſemen circa Chalepum collectum miſit.

E.

Ephedra *v.* Poligonum.

Eruca Chalepenſis, caulibus & Siliquis hirſutis, foliis inferioribus maculatis *Moriſ. hiſt.* Chalepo ſemen à *D. Huntingdon* tranſmiſſum eſt.

Eruca Chalepenſis, flore dilutè violaceo, ſiliquis articulatis *Moriſ. hiſt.* Hæc etiam ab eodem miſſa, & ejuſdem loci eſt.

Eryngium ſtellatum capitulis cæruleis *Rauwolf.* Halepi inter ſegetes obſervavit Autor p. 107.

F.

Ficus Cipria *J. B. Rauwolf.* Sycomorus altera ſeu Ficus Cypria *Park.* Ficus folio Sycomori, fructum non in caudice gerens *C. B.* Circa Tripolin p. 50.

Fuſtick Wood, Chryſoxylon *Wheeleri.* In rupibus Peloponeſiacis.

G.

Garab. *ſ.* Garb. *v.* Salix.

Geniſta ſpinoſa floribus rubris *Wheeler.* In Inſula Teno.

Geniſta-ſpartium ſpinoſum foliis Poligoni *C. B. v. Alhagi.*

Gingidium folio fœniculi *C. B. v.* Anetho ſimilis, &c.

Glans unguentaria *C. B.* Nux Ben ſive Glans unguentaria *Park.* Nux unguentaria *J. B.* Balanus myrepſica *Ger.* In Arabia prope *Pharagon* in itinera à Cayro ad montem Sinai *Bellon.*

Gnaphalio affinis Ægyptiaca *C. B.* Baccharis Rauwolfii *Lugd. app. Cluſ. Hiſt.* Dioſcoridis Rauwolfio *J. B.* Gnaphalium foliis Auriculæ ſubrotundis, flore duplici niveo in Monte Libano obſervavit *Rauwolf.* p. 232. v. Chryſocome.

H.

Habhel Affis Tripolitanis, ſive Granum Altzelem Arabum Rauwolfii p. 55. *i. e.* Traſi veronenſium *Lob.*

Hacub ſeu Silybum quibuſdam *J. B.* Circa Halepum locis aſperis. p. 66, 67.

Harmala *v.* Ruta Syriaca.

Helichryſum Abrotani fœminæ foliis *Boccon.* Abrotanum fœmina verum Dioſcoridis *Zanoni.* Ex ſemine Perſide allato in horto M. Ducis Etruriæ ſuccrevit.

Helichryſon Orientale *C. B.* Heliochryſum Orientale, ſive Amarantus luteus *Park. parad.* Stœchas citrina floris & magnitudine & colore ſpecioſa. *J. B.* An Chryſocome vera Dioſcoridis *Zanoni?* Helychryſon Orientale à Cretica ſpecie diverſum nobis eſſe videtur.

Heſperis Syriaca *J. B.* Syriaca Camerarii *Park.* Peregrina ſiliquis articulatis *C. B.* Leucoium Melancholicum *quibuſdam.* In Syriæ montanis oritur teſte Cluſio.

Hieracium echioides, capitulis Cardui benedicti majus, Arabicum, folio ſinuato *Hort. Edinburg.*

Horminum ſativum genuinum Dioſcoridis *Park.* Sativum *C. B.* Sylv. foliis purpureis *Ger.* Comâ purpuro violacea *J. B.* In Inſula Leſena & univerſa Græcia.

Horminum Syriacum *C. B. prod. Park.* Gallitrichum exoticum flore magno albo *J. B.* Biſermas Camerarii Aman quibuſdam. Paludanus è Syria redux hujus ſemen attulit.

Horminum Syriacum tomentoſum foliis Coronopi ſive profundè laciniatis *Breyn. prod.* 2. rarum foliis laciniatis *Rauwolf.* p. 107.

Hyacinthus comoſus Byzantinus *Cluſ. Ger. Park.* Comoſus albus Byzantinus *C. B.* Comoſus Byzantinus candicans cum ſtaminulis purpureis *J. B.*

Hyacinthus

Hyacinthus racemoſus moſchatus *C. B.* Botroides major moſchatus, ſive Muſcari flore cinericeo *Park.* Odoratiſſimus dictus Tibcadi & Muſcari *J. B.* Muſcari obſoletiore flore *Cluſ.* Muſcari Cluſſii *Ger.* E vicinis Conſtantinopoli hortis, ultra Boſphorum in Aſia ſitis primùm Europæ communicata eſt *Cluſ.*

Hyacinthus Orientalis, quibuſdam Conſtantinopolitanus *J. B.* Orientalis *C. B.* cujus duodecim aut tredecim recenſet ſpecies: plures Parkinſonus. Alii enim latifolii ſunt, alii anguſtifolii. Horum alii floribus purpureis ſunt, alii albis vel exalbidis. Utriuſque generis alii polyanthes ſunt floribus vel in unum latus propendentibus, vel in omnem partem æqualiter ſparſis; alii pauciores producunt flores. Circa Halepum copioſiſſ. *Rauwolf.* p. 109.

Hyacinthus ſtellatus Byzantinus *J. B.* Stell. Byzantin. nigrâ radice *Park.* St. Byz. nig. rad. flore cæruleo *Ger.* Stellaris obſoletè cæruleus vel major *C. B.*

Hyacinthus Stellatus Byzantinus major flore Boraginis *Ger.* St. Byz. alter ſ. flore Boraginis *Park.* St. Byz. alter elegantiſſimus ſerotinus bullatus *J. B.* Stellaris cæruleus amœnus *C. B.*

Hyacinthus eriophorus *Park. parad.* Bulbus eriophorus *Cluſ. Ger.* Eriophorus Orientalis *C. B.* Conſtantinopoli ſæpius miſſus eſt *Cluſ.*

Hyacinthus Tripolitanus *J. B.* Exoticus flore Phalangii *C. B.* Florebat Aprili Hepali, ubi obſervavit Rauwolfius. Hyacinthus Halepi *Ayr* dictus Rauwolfii p. 109.

Hyoſcyamus Ægyptius cauliculis ſpinoſiſſimis *Moriſ. hiſt.* Ægyptius, cauliculis ſpinoſis *C. B.* Peculiaris flore purpuraſcente *J. B.* Et Hyoſcyamus Syriacus *ejuſdem* & *Cam.* Ex ſemine Halepo à D. *Huntingdon* miſſo Moriſono ortus eſt. Eundem obſervavit etiam Rauwolfius in arvis circa Halepum, p. 111.

Hypericon montis Olympi *Wheeler.* An Aſcyron magno flore *C. B.*? In Olympo Aſiæ monte.

Hypericum Syriacum *Ger.* Syriacum & Alexandrinum *J. B.* Folio breviore *C. B.*

I.

Jacea Babylonica *C. B. prod. Park.* Hujus Folium C. Bauhinus ex horto Contareni habuit.

Jacea maxima *Alpin. exot.* Ex ſeminibus Hieroſolymâ delatis enata eſt.

Jaceam laciniatam capitulis luteis & jaceam capitulis purpuraſcentibus Monte Libano obſervavit *Rauwolf.* p. 231, 232. Vide Catalogum generalem.

Jaſminum ſive Sambac Arabum Alpino *J. B.* Sambac Arabicum ſ. Gelſeminum Arabicum *Alpin. Ægypt.* Syringa Arabica foliis Mali Aurantii *C. B.*

Jaſminum Perſicum *v.* Syringa.

Iris bulboſa Perſica *Park. parad.* Perſica variegata præcox *Ferrar. Flor.*

Iris Chalcedonica *Ger.* Chalcedonica ſ. Suſiana major *Park.* Suſiana flore maximo ex albo nigricante *C. B.* Latifolia major Suſiana vel Chalcedonica, flore majore variegato Cluſia *J. B.* Conſtantinopoli delata eſt.

Iris Aſiatica cærulea Polyanthos *C. B.* Aſiatica cærulea omnium ampliſſima, Dalmaticæ affinis *J. B.* Conſtantinopoli accepit Cluſius.

Iris Byzantina purpuro cærulea *C. B.* Major latifolia Byzantina, Dalmaticæ minori ſimilis *J. B.* Major Latifolia 18. *Cluſ.*

Iris Aſiatica purpurea *C. B.* Aſiat. purp. major. latifolia *J. B.* Major latif. 5, ſive Aſiatica purp. *Cluſ.*

Iris Damaſcena polyanthos *C. B.* Major latifolia 4. ſ. Damaſcena *Cluſ.* Major latif. ſive Damaſcena cærulea *J. B.*

Iris Tripolitana *Cluſ.* Tripolitana foliis longiſſimis, flore aureo *J. B.* Media longiſſimis foliis lutea *C. B.*

Iris tuberoſa *C. B. Ger, Park.* Tuberoſa Belgarum *J. B.* Ex Arabia & regionibus Orientalibus.

K.

Kali Arabum primum genus *Rauwolf. Lugd. app. C. B.* Juxta Tripolin copioſiſſimum obſervavit Rauwolfius p. 33.

Kal

Kali Arabum ſecundum genus *Rauwolf. Lugd. app.* Kali geniculatum alterum vel minus *C. B.* Cali Arabum aliud *J. B.* Circa Tripolin Syriæ *Rauwolf.* ibid.

Kiſmeſen vel Keſmeſen *Bellonio.* Acacalis quorundam ſ. Keſmeſen foliis Ceratiæ *J. B.* Siliquæ Sylveſtri ſimilis, an Dioſcoridis Acacalis *C. B.* Semen hujus Cayrinæ & Kiſmeſen nomine à Paludano ex Syria reduce accepit C. Bauhinus.

L.

Lamium moſchatum, foliorum marginibus argentatis *Wheeler.* Circa Panthæum inter Amphiſſam & Naupactum in Græcia.

Lapathum Chalepenſe folio acuto, ſeminum involucris profundè dentatis *Moriſ. hiſt.*

Laſerpitium *Alpin. exot. Bod. à Stapel.* Comm. in Theophr. hiſt. *lib.* 6. *p.* 588. Ex ſeminibus à Thracia delatis ortum eſt.

Lathyrus ἀμφίκαρπος ſ. ſupra infraque terram ſiliquas gerens *Moriſ. hiſt.* An Araco ſimilis planta ex Hiſpania miſſa *Bod. à Stapel.* In Aſia Syriaque provenit Semina ab urbe Chalepo à D. *Roberto Huntingdon* ad Moriſonum tranſmiſſa fuere.

Lauroceraſus *Cluſ. Ger. J. B.* Ceraſus folio Laurino *C. B.* Ceraſus Trapezuntina ſ. Lauro-ceraſus *Park.* A Trapezunte primò in Conſtantinopolin illata dicitur, inde in Europam.

Leontopetalon *Ger. Park. C. B.* quorundam *J. B.* Aſſab Syrorum. Circa Halepum *Rauwolfius* reperit. D. *Wheelerus* per totam planitiem Atticam inter Athenas & Hymettum *Rauw.* p. 108.

Lepidium Dioſcoridis *Zanoni*, Planta Perſica. Maximum Chalepenſe, primis foliis minoribus & ſerratis; ſecundis majoribus & profundè ſinuatis, ſpiſſis incanis *Moriſ. hiſt.*

Leucoium Alyſſoides clypeatum majus *C. B.* Alyſſon Dioſcorides. Ad *Conrengeli* pagum in Bythinia *Wheeler.* Monte Libano *Rauwolf.* p. 231.

Libanotis latifolia Aquilegiæ folio *C. B. Park. J. B.* Liguſticum Rauwolfii foliis Aquilegiæ *J. B.*

Lilium album Syriacum Rauwolfii *J. B.* Album Byzantinum *Cluſ. Park. Ger.* Album floribus dependentibus ſeu peregrinum *C. B.* Sultan *Zambach* & Martagon Conſtantinopolitanum flore albo *Cluſ. hiſt.* Halepi locis aquoſis.

Lilium Byzantinum miniatum *C. B.* Flore miniato nutante, ſive Hemerocallis Chalcedonica quibuſdam *J. B.* Lil. rubrum Byzantinum ſ. Martagon Conſtantinopolitanum *Park.*

Lilium Suſianum *Cluſ.* Perſicum *Ger. Park. C. B.* Perſicum ſive Suſianum *J. B.* Suſianum dictum eſt, quod Suſis Perſiæ urbe delatum fuerit.

Linaria annua Chalepenſis, minor, erecta, flore albo, lineis violaceis notato, calyci ex quinis foliis conſtanti inſidente *Moriſ. hiſt.* A D. *R. Huntingdon* ſemen accepit.

Linariæ purpuraſcentis ducas ſpecies Monte Libano obſervavit *Rauwolf.* p. 232.

Lupinus peregrinus pentaphyllos *C. B.* Arabicus, ſive Pentaphyllum peregrinum *Ponæ Ital.* Pentaphyllum peregrinum Siliquoſum bivalve minus *Moriſ. hiſt.* Ex ſemine Chalepo Syriæ urbe tranſmiſſo Moriſono enata eſt.

Lychnidis Chalcedonicæ umbellâ Phlomos Lychnitis altera Syriaca *Lob.* Phlomos Lychnitis Syriaca *Ger.* Verbaſcum acuto Salviæ folio *C. B.* Foliis Salviæ enuifoliæ Syriacum *Park.* Verb. Lychn. Syriacum incanum ſummitate floris Hieroſolymitanæ *J. B.*

Lychnis Chalcedonica *Ger. Park.* Hirſuta flore coccineo major *C. B.* Flos Conſtantinopolitanus miniatus, albus & varius *J. B.*

Lychnis flore punctato *Wheeleri.* In Inſula Zazyntho.

Lychnis Sylveſtris hirſuta annua, flore minore carneo *Moriſ. hiſt.* Semina à D. *Huntington* Chalepo tranſmiſſa ſunt.

Lychnis Chalepenſis annua, foliis parum hirtis & anguſtis, floſculis carneis, pediculis biuncialibus inſiſtentibus, capſulis fere rotundis *Moriſ. hiſt.*

Lycium Dioſcoridis *Rauwolf.* Buxi foliis anguſtioribus Syriacum *Breyn. Prod.* 2. Hadhad Arabibus & Zarca incolis montis Libani *p.* 233.

Lycium Buxi foliis rotundioribus Syriacum vel Perſicum *Breyn. prod.* 2. quem conſule.

Lycopſis Dioſcoridis *Rauwolf. Lugd. app.* Lycopſis Ægyptiaca *C. B.* p. 109. Circa Halepum in arvis.

M.

Majorana Syriaca vel Cretica *C. B.* Marum Syriacum *Ad. Lob. Ger.* Syriacum vel Creticum *Park.*

Malva hortenſis ſeu roſea folio ſubrotundo cauleſcens, flore ſimplici minore luteo-pallido Chalepenſis *Moriſ. hiſt.*

Marrubium villoſum Syriacum ſeu montis Libani *Breyn. prod.* 2.

Medica trifolia foliis diſſectis *Rauwolf.* p. 107.

Medica ſiliquis compreſſis viridibus longitudine & latitudine Siliquarum Senæ *Rauwolf.* ibid.

Medium Dioſcoridis Rauwolfii *J. B.* Viola Mariana laciniatis folios peregrina *C. B.* Mariana peregrina *Park.* v. viola.

Megaſac Arabum, *i. e.* Poterium *Matth. Raw.* 106.

Melantzana vel Melongena *v.* Solanum pomiferum.

Melilotus curvis ſiliquis biuncialibus Syriaca ſ. Chalepenſis major *Moriſ. hiſt.* D. *Huntington* miſit.

Melilotus Syriaca *Park.* Syriaca odora *Ger.* Melilotus corniculis reflexis major *C. B.* Non Syriaca tantùm eſt, ſed & Italica, verum in Syriaca ſiliqua videtur magis curva falcatave *Lob.* Melilotus ſiliculis pendentibus longis, curvis ex eodem centro ortis Germanica ſeu Italica Syriacáve recta *Moriſ. hiſt.* D. Huntington ſemen ex Halepo tranſmiſit.

Melilotus lutea minor, floribus & ſiliculis majoribus, ſpicatim & rarò diſpoſitis, foliis anguſtioribus, maculis ſub exortum notatis *Moriſ. hiſt.* Hanc etiam ſpeciem ſemine à D. *Huntington* accepto debemus.

Melilotus minima Syriaca. Nephel ſive Naphal Ibenbaithar & Malaſeſæ *Breyn. prod.* 2.

Meliſſa Turcica *Ger.* Turcica multis dicta *J. B.* Turcica flore cæruleo & albo *Park.* Peregrina folio oblongo *C. B.* Ex Moldavia ad nos primum deleta eſt.

Meliſſa Moluca lævis ſive Syriaca lævis *Park. Rauwolf.* p. 49. Mel. Molucca lævis *Ger.* Molucana odorata *C. B.* Aſiaticæ originis eſt, Conſtantinopoli primùm delata,

delata, unde & nonnullis Meliſſa Conſtantinopolitana dicitur. Ejuſdem loci & originis eſt Meliſſa Molucca aſperior; quæ & in Sicilia ſpontanea eſt *v.* Cat. Sic.

Melochia *v.* Corchorus Plinii.

Mes ſive Meiſce Avicennæ *v.* Mungo.

Morgſani Syrorum *Rauwolf.* i. e. Capparis Portulacæ folio *C. B.* Capparis fabago *Ger.* Fabaginea ſeu Peplis Lutetianorum *J. B.* Fabago ſ. leguminoſa *Park.* Telephium Dioſcoridis & Plinii *Col.* Circa Tripolin invenit Rauwolffius.

Moſſelini ſeu Muſlin panni linei è Goſſipii quadam ſpecie facti, & à regione *Moſſoli* dicta in Meſopotamia denominati.

Mungo *Col. Cluſ. J. B. Garc.* Fructus niger Coriandro ſimilis *C. B.* Mes ſive Meiſce Avicennæ *Rauwolf.* p. 68. Naſci ferunt in Palæſtina Halepi obſervavit Rauwolffius; ubi ſemina Turcis in pretio ſunt, & cum Oryza mixta in deliciis habentur.

Myagyrum Arabicum Roſa Hierichuntina perperam dictum Zanoni *v.* Roſa Hierichontica.

Myrtus fructu nigro cæruleo, Sorby magnitudine eduli *Rauwolf.* p. 65. An Myrtus auguſtifolia Bætica *C. B. Cluſ. hiſt.*

N.

Narciſſus Perſicus *Cluſ. Park. Ger.* Colchicum melino flore *C. B.*

Naſturtium Babylonicum *Lob.* Eſt Draba umbellata ſ. Draba major capitulis donata *C. B.*

Negil *Rauwolf.* Grammini rubro loliaceo affine p. 195. Pecori exitiale.

O.

Olea ſylv. folio molli incano *C. B.* Zizyphus Cappadocia quibuſdam olea Bohemica *J. B.* Zizyphus alba *Bellon.* Seiſefun *Rauwolf.* Monte Libano aliiſque Syriæ locis obſervavit *Rauwolf.* p. 101. 226.

Origanum Smyrnæum *Wheeleri hiſt. noſt.* p. 540. Smyrna in monte cui Arx inedificatur copioſè.

Ornithogalum Arabicum *Cluſ. Park.* Majus Arabicum *Ger. emac.* Umbellatum maximum *C. B.* Lilium Alexandrinum ſ. Ornithog. maximum Syriacum *J. B.*

Onobrychis major annua, ſiliculis articulatis, aſperis, clypeatis, undulatim (i. e. antroſum & retroſom) junctis, flore purpuro-rubente *Moriſ. hiſt.* Ex ſemine Chalepo à D. *Huntington* tranſmiſſo in horto Academico Oxonienſi errata eſt.

P.

Parma major *C. B.* Palma Dactylifera *Jonſton.* In Syria frequens.

Panax Syriacum Theoph. eſt Panax Paſtinacæ folio ſive Heracleum majus; in Sicilia nobis obſervatum. v. *Cat. gen.*

Papaver Corniculatum flore ſanguineo *Wheeleri.* In Attica circa Hymettum.

Perſea *C. B. J. B.* Arbor *Ger.* Arbor *Cluſ. Park.* In Perſia oriri dicitur & venenoſa ibi eſſe, cum in Ægypto nata innocens ſit.

Periploca latifolia *Wheeleri* itin. p. 223. Ad vias publicas prope Pruſiam Bythiniæ urbem.

Petromarula Cretica in monte Parnaſſo è rupium fiſſuris exit *Wheeler.*

Phaſeolus Turcicus flore flavo *Rauwolf.* p. 49.

Planta lactaria Xabra & Camarronum Rhaſis &c. *v.* Tithymalus.

Piſtacea *Ger. J. B.* Nux Piſtacea *Park.* Piſtacea Peregrina fructu racemoſo, ſive Terebinthus Indica Theophraſti *C. B.* Multis Syriæ locis abundat, ut circa *Sermin* urbem, inter Tripolin & Halepum, ubi integræ earum Sylve ſunt necnon circa Tripolin ipſam p. 59, & 64.

Polium Gnaphaloides *Alpin. exot. Park.* Wheelerus in Monte Parnaſſo obſervavit, unde Plantam à Gnaphalio maritimo vulgari diſtinctam eſſe, contra quam aliquando opinati ſumus, veriſimile eſt.

Polygonum bacciferum ſcandens *C. B.* Ephedra ſive Anabaſis Bellonii *Park.* Ad pedes montis Olympi & in monte Hæmo. item circa Tripolin Syria *Rauwolf.* p. 49.

Polygonum

Polygonum maximum, longiſſimis cauliculus & foliis *Moriſ. hiſt.* Circa Halepum Syriæ urbem invenitur.

Poterium *Matth.* i. e. Tragacanthæ affinis lanuginoſa ſive Poterium *C. B.* Circa Halepum obſervavit *Rauwolf.* p. 107. *v. Cat. Hiſpan.*

Prunella Spinoſa *Wheeler.* In Atticæ monte Himetto.

Pſeudo dictamnus acetabulis Moluccæ *C. B.* Alter Theophraſti Ponæ *Park.* In Cithæra Inſula *Wheeler.*

Pulſatilla rubra *Ger. J. B.* Flore rubro *Park.* Flore rubro obtuſo *C. B.* Ex Halepo habuit Lobelius.

Q.

Quadrifolium annuum Perſicum Zanoni.

R.

Ranunculus Aſiaticus grumoſa Radice 1 *Cluſ.* Tripolitanus *Ger.* Tripolitanus flore Phœnicio *J. B.* Aſiaticus ſive Tripolitanus flore rubro *Park.* Grumoſa radice, flore Phœniceo minimo ſimplici *C. B.*

Ranunculi Aſiatici plurimæ ſeu ſpecies, ſeu varietates in hortis aluntur, quas omnes recenſere nimis Longum foret. Conſulantur Cluſius, C. Bauhinus, Hortus Regius Pariſienſis, aliique.

Raphaniſtrum monoſpermon maximum Chalepenſe, flore luteo, capſula rotunda ſtriata *Moriſ. Hiſt.*

Rhamnus ſpinis oblongis, flore candicante *C. B.* Hauſet & Hauſegi ſive Rhamnus primus *Rauwolf.* Circa Tripolin.

Rhaponticum Thracicum ſ. Hippolapathum maximum rotundifolium exoticum, Rhabarbarum verum nonnullis falsò creditum. In Rhodope Thraciæ monte *Alpin.*

Ribes verum Arabum *J. B.* Arabum, foliis Petaſitidis *C. B.* Lapathum rhotundifolium montis Libani ſemine maximo *Breyn. prod.* 2. An Ribes Belloni de Coniferis? *Rauwolfius* in monte Libano obſervavit, & figuram ejus exhibuit. p. 220, 230, 231.

Roſa Hierichontea vulgo dicta *C. B. Park.* Thlaſpi Roſa de Hiericho dictum *Moriſ. Hiſt.* Myagrum Arabicum Roſu Hierichuntina perperam dictum *Zanoni.* Circa Hiericho nuſquam reperitur, ſed in Arabia deſerta ad litora maris in fabulo. *Bellon.*

Roſæ

Roſæ Hierachonteæ altera ſpecies ſylveſtris *C. B. Park.* Myagrum Syriacum ſemine ſpinoſa *Zanoni.* In Syriæ tectis & ruderibus invenit Rauwolfius.

Ruta quæ dici ſolet Harmala *J. B.* Sylveſtris Syriaca ſive Harmala *Park.* Sylv. flore magno *C. B.*

Melanthium Syriacum minus fruteſcens latifolium, Rutæ flore, fructu tricapſulari *Breyn. prod. 2.*

Ruta Chalepenſis tenuifolia, florum petalis villis ſcatentibus *Moriſ. Hiſt. Cat. Hort. Lugd. Bat.*

S.

Salix Arabica folio Atriplicis *C. B.* Humilis Arabica folio Atriplicis *Park.* Garab Maurorum, Salicis genus *J. B.* Garab Maurorum *Rauwolf. Lugd. app.* p. 101. Garb Itinerar. *Rauwolf.* p. 159.

Salix Syriaca folio oleagineo argenteo *C. B.* Ægyptiaca & Syriaca *Park.* Salſaf Syrorum, Salicis ſpecies *J. B.* Circa Halepum.

Salvia Syriaca Ciſti fœminæ foliis, acetabulis moluccæ *Breyn. cent.* Hujus meminit Rauwolfius in Hodœporico p. 108.

Satureia fruteſcens Arabica folio fimbriato hirſuto *Breyn. prod. 2.* Sathar Arabum *Rauwolfii,* Hyſſopum montanum Cilicium quibuſdam *J. B.* Hyſſopus montana anguſtifolia aſpera *C. B.* Montana vel de Ciliſſa *Park.*

Scabioſa argentea petræa. In iſthmo Corinthiaco.

Scabioſa argentea minor montis Sipyli *Wheeleri itin.* p. 239.

Scammonia Syriaca *C. B.* Syriaca legitima *Park.* Syriaca flore majore Convolvuli *J. B.* Scammonium Syriacum *Ger.* In calidis pingui ſolo exit ut in Aſia & Syria, & Bellonio teſte etiam in Creta.

Schamuth Arabum ſeu Schack *Rauwolf.* p. 103. 152. C. Bauhino Acacia Ægyptiaca habetur; nobis tamen aliter videtur, ut ex ſiliquæ deſcriptione apparet.

Scorzonera radice rotunda *Wheeleri. Galacorta* Græcis modernis. In Attica circa Hymettum montem.

Scorzonera foliis fiſtuloſis, *Galacorta* etiam dicta *Wheeler.* Cum priore.

Scorzo-

Scorzonera Orientalis *Vesling* notis in *Prosp. Alpin.* de Plant. Ægypt. In Palæstina & finitimis Ægypti. An Scorzonera Chalepensis flore purpureo *Rauwolf.* p. 104. Alteram Scorzoneram floribus luteis monte Libano observavit *Rauwolf.* p. 230.

Scordium lanuginosum alterum verticillatum *C. B.* Scordotis tomentosa Cretica *J. B.* Prope Mandragorui vicum in Phrygia observavit D. *Wheelerus.*

Sebestena domestica an ὁμοιωξις Athenæo *C. B.* Mixa sive Sebesten *J. B.* Myxos sive Sebesten *Park.* Sebestena, Myxa s. Mixara *Ger.* In Asia & Ægyto *Rauwolf.* p. 21.

Secacul Arabum. *v.* Sisarum.

Secudes Arabum. *v.* Stœchadi serratæ affinis.

Seisefun *Rauwolf.* Halepi in locis humidis & sepibus frequens, est Olea Bohemica *Matth. Rauwolf.* p. 101.

Sepha, seu Persea Arbor Venenata *Rauwolf.* p. 197.

Sideritis Persica odorata *Zanoni.* An Herba venti Monspelliensium?

Sisarum Syriacum *C. B.* Alterum Syriacum *Park.* Secacul Arabum & Mauritanorum, sive Pastinaca Syriaca *Rauwolf. Lugd. app. J. B. Rauwolf.* p. 66.

Sisyrinchium Persianum *C. B.* Flos Persicus Sisyrhinchio congener *Clus. Hist.*

Sisyrhinchium Chelepense *Tharasalis* dictum *Rauwolf.* p. 104.

Solanum pomiferum fructu incurvo *C. B. J. B.* Melantzana Arabum Rauwolfii *Lugd. app.* Halepi. p. 66.

Solanum pomiferum fructu spinoso *J. B.* Melantzana nigra *Rauwolf. Lugd. app.*

Sorghi album, Milium Indicum *J. B.* Milium Arundinaceum semine plano & albo *C. B.* Dora *Rauwolf.* p. 171. In Arabia circa Anam.

Spartium alterum monospermon, semine reni simili *C. B.* Secundum Hispaniacum *Clus.* Prope Thyatiram in Asia invenit D. *Wheelerus.* v. *Cat. Hispan.*

Speculum Veneris Thracicum flore amplissimo. Inter segetes propè Constantinopolin invenit D. *Covel* SS. Theolog. Doctor, & Collegii Christi in Cantabrigia Præses dignissimus.

Stachys viscosa flore luteo *Wheeler.* In monte Parnasso.

Stœchadi

Stœchadi ſerratæ affinis *C. B.* Tragium alterum Dioſcoridis quibuſdam, folio Trichomanis *J. B.* Secudes & Sucudus Avicennæ *Rauwolf. p.* 112. *Lugd. app.*

Sycomorus *J. B. Jer.* Sycomorus ſive Ficus Ægyptia *Park.* Ficus folio Mori, fructum in caudice ferens *C. B.* In Syria & Palæſtina non minùs frequens eſt quàm in Ægypto. p. 50. 51.

Syringa Perſica ſive Lilac Perſicum inciſis foliis. Jaſminum Perſicum dictum *Park.* Agem Lilag Perſarum, ſ. Lilac inciſo folio *Cornuto* Liguſtrum foliis laciniatis. *C. B.* Syringa Perſica purpurea duplex, foliis laciniatis, & foliis integris.

T.

Terebinthus Indica major fructu rotundo *J. B.* Peregrina, fructu majore. Piſtaciis ſimili eduli *C. B.* latifolia *Ger. Park.* Indica prior Theophraſti, major. *Rauwolf. Lugd. app.*

Terebinthus Indica, fructu parvo ad cœruleum accedente *J. B.* Peregrina fructu minore cœruleo & eduli *C. B.* Hujus fructus *Botn Soagier* illius *Botn quibir* Arabibus dicitur. *Rauwolf.* p. 193. 205. In Perſia Meſopotamia & Armenia.

Tereniabin Mannæ genus *v.* Alhagi. *Rauw.* p. 85.

Tharaſalis *v.* Siſyrhynchium.

Thlaſpi fruticoſum Perſicum foliis Keiri *Zanoni.* Fruticoſum Leucoii folio *C. B. Park.* Latifolium platycarpon Leucoii foliis *P. Boccone.*

Thlaſpi verum Dioſcoridis ſ. Perſicum *Zanoni.* Thlaſpi Alexandrinum *C. B. Park.* Alexandrinum Cortuſi Jo. Bauhini *J. B.*

Thymus verus Dioſcoridis, Haſce Arabum *Rauw.* p. 52.

Tithymalus ſpinoſus Creticus *Alpin.* Maritimus ſpinoſus *C. B.* Marit. Creticus ſpinoſus *Park.* In Græcia, plurimis in locis.

Tithymalus (vel Tithymalo affinis) aphyllos dictus major Indicus, latifolius, flore ſanguineo aviculæ capitulum repræſentante *Breyn.* An Planta lactaria, Xabra & Camaronum Rhaſis *Rauwolf.* & *C. B. pin.*

Tragacantha humilior floribus luteis *C. B.* Syriaca flaveſcens *Park.* Trag. *Rauwolfius J. B.* In monte Libano *Rauwolf.* p. 230.

Tra-

Tragacantha Syriaca purpuraſcens *Park.* Tertia *Rauwolfii.* In eodem monte.

Tragium alterum Dioſcoridis *Rauwolf. v.* Stœchadi ſerratæ affinis.

Trionum Theophraſti *Rauw. Lugd. app.* Eſt Alcea Indica parvo flore *C. B.* i. e. Bamia *v.* Alcea.

Trunſchibil Mannæ genus *Rauw.* p. 84. *v.* Alhagi.

Tulipa Perſica *Park.* Variegata Perſica *C. B.* Perſica præcox *Cluſ. cur. poſt.*

Tulipam omne genus colorum circa Halepum obſervavit *Rauwolfius* p. 109.

V.

Verbaſcum ſubrotundo Salviæ folio Syriacum *C. B.* Salvifolium exoticum ciſtoides *Park.* Sylveſtre Salvifolium exoticum; folio rotundiore *J. B.*

Viola Mariana laciniatis foliis peregrina *C. B.* Medium *Dioſcor.* & Mindium *Rhoſis Rauwolf.* p. 232. Monte Libano obſervavit *Rauwolf.* Trachelii ſeu Campanulæ ſpecies eſt.

Vitex trifolia minor *C. B.* Agni caſti ſpecies multò minor cæteris, tribus tantùm firmis foliis donata *Rauwolf.* p. 153.

Z.

Zarneb & Zarnabum Arabum *v.* Salix Saffaf.

Zarneb melchi *v.* Daucus tertius Dioſcoridis.

Zaroa. *v.* Lycium.

Stirpium

Stirpium Ægyptiacorum Catalogus.

A

ABdellavi *v.* Melo Ægytius.
Abelmoſch. *v.* Alcea Ægyptiaca villoſa *C. B.*
Abrus *v.* Phaſeolus Indicus ruber *Bontii.*
Abſynthium Santonicum Ægyptiacum *Park. C. B.* Ægyptium quibuſdam *J. B.* Abrotani fœminæ ſpecies ſecunda *Zanoni.*
Abſus ſeu Lotus Ægyptiaca *Park.* Abſus *Alpin. Ægypt. Veſling.* Loto affinis Ægyptiaca *C. B.*
Abutilon Avicennæ *Ponæ Ital. Alpin.* Eſt Abelmoſch ſeu Alcea Indica Moſchata.
Acacalis eſt Kiſmeſen *Bellon. v. Cat. Orient.*
Acacia vera *J. B.* Vera ſive Spina Ægyptiaca *Park.* Dioſcoridis *Ger.* Foliis ſcorpioidis leguminoſæ *C. B.*
Achaovan *Alpin. Æg.* Matricaria inodora *C. B. Park.* Parthenium inodorum ſive Achaovan Ægyptiorum *J. B.*
Agihalid Ægyptiaca Lycio affinis *Park.* Ægyptium folio buxi, an Lycium? *J. B.* Lycio affinis Ægyptiaca *C. B.* Uzeg Alpini affinis & ſimilis eſt, ſi non eadem.
Alcanna *v.* Liguſtrum Orientale.
Alcea Ægyptia villoſa *C. B.* Ægyptia moſchata *Park.* Belmuſcus Ægyptia *Honor. Bell. J. B.* Ab-el-moſch ſive Moſch Arabum *Veſling.*
Alchimelech Ægyptiorum *v.* Melilotus Ægyptiaca.
Amomum Plinii *Ger.* Solanum fruticoſum Americanum, dictum Amomum Plinii *Park.* Fruticoſum bacciferum *C. B.* Strychnodendros *J. B.* In Ægypto paſſim *Veſling.*
Arum maximum Ægyptiacum, quod vulgo Colocaſia *C. B.* Ægypto rotunda & longa radice vulgo Colocaſia dicta *Park.* Colocaſia *Cluſ. J. B.* Ægyptiaca *Ger.*

B.

Balſamum verum antiquorum nec Ægypti nex Judææ indigena eſt, ſed Arabiæ Fœlicis *v.* Cat. Oriental.

Bammia *J. B.* Seu Alcea Ægyptiaca *Park. Parad.* Alcea Ægyptiaca *Ger. emac.* Indica parvo flore *C. B.* In Ægypto frequentiſſima.

Ban vel Bon arbor *J. B.* Item Buna, Bunnu & Bunchos Arabum *ejuſdem.* Bon arbor cum fructu ſuo Buna *Park.* Euonymo ſimilis Ægyptiaca, fructu baccis Lauri ſimili *C. B.* Male Ægyptiacam vocat, neque enim ſpontanea, neque culta in Ægypto invenitur ſed in Arabia Fœlice tantum Bunnu Rauwolfii, Buna ex qua in Alexandria fit potio [Coffee dicta.]

Ban ſeu Calaf *Alpin.* Saffaf Syrorum *Rauwolf* vel eadem eſt, vel ei vaide affinis. v. *Cat. Orient.*

Baobab *Alpino*, Baohab ſive Abavus *Cluſ. J. B.* Abavo arbor radice tuberoſa *C. B.* Abavi Æthiopicus fructus bello *J. B.* Guanabanus Scaligeri huic Eadem arbor eſſe videtur. Æthiopiæ natales debet, Ægypto advena eſt.

Beidelſar Alpini, ſeu Apocynum Syriacum *J. B.* Apocynum Syriacum Cluſii *Ger. emac.* Lapathum Ægyptiacum lacteſcens ſiliqua Aſclepiadis *C. B.* Paul Hermannus in *Cat. Hort. Leyd.* Plantam hanc ab Apocyno majori rectoSyriaco *Cornut.* Specie diverſam facit; quo cum conſentit Commelinus in *Cat. Hort. Amſtel.* Jac. Breynices in *Prod.* 2. Veſlingum reprehendit quod quo Apocyno hoc Apocynum majus Syriacum rectum Cornuti poſuerit. Verum in titulo Apocyni hujus non omnino conſentit cum Hermanno & Commelino: Siquidem hi, ut & Scholæ Botanicæ Tournefortii, Apocynum latifolium Ægyptiacum, incanum, erectum, floribus ſpicatis maximis pallide violaceis, ſiliquis folliculatis rugoſis hoc vocant: Breynius autem, Apocynum erectum majus latifolium Ægyptiacum flore luteo ſpicato. Apocynum autem illud latifolium, &c. floribus pallide violaceis, &c. *Hermanni* & aliorum. Indicam & diſtinctam plantam facit, titulo Apocyni erecti majoris latifolii Indici flore concavo amplo carneo ſuave-rubente & cum antecedenti *i. e.* Ægyptiaco non confundendam monet.

Braſſica

Braſſica ſpinoſa *C. B.* Ægyptiaca *Alpin. exot. Park.* In Ægypto, Æthiopia & Syria.

C.

Caova *Alpin.* i. e. Coffee Potio.

Capparis non ſpinoſa fructu majore *C. B. Park.* Alpinus Cappares Alexandriæ majores quàm alibi inveniantur provenire ſcribit.

Carob ſ. Carub *i. e.* Siliqua dulcis in Syria & Palæſtina, & circa Hieroſolymam multò frequentior eſt quàm in Ægypto.

Caſſab & Darira *Alp. exot.* Lyſimachia lutea Ægytiaca *Hiſt. noſt.* p. 1022. In Ægyto, locis humidis, inque judæa circa lacum Genneſareth, & multis Syriæ in locis.

Caſſia fiſtula Alexandrina *C. B.* Fiſtula *Ger.* Purgatrix *J. B.* Solutiva vulgaris *Park.* In Ægypto aliiſque regionibus calidioribus.

Chate *Alpin.* Cucumis Ægyptius Chate *J. B.* Cucumis Ægytius rotundifolius *C. B.*

Caucalis Daucoides Tingitana *Moriſ. præl.*

Chamædrys arborea Ægyptiaca *C. B.* Arborea in Inſula Corcyra *Alpin.* Neſcio cur C. Bauhinus hanc Plantam Ægptiacam denominet, cum Alpinus in Ægypto naſci non affirmit, ſed in Corcyra inſula.

Colocaſia *v.* Arum Ægyptiacum.

Convolvulus Ægyptiacus quinquefolius C. Bauhini *J. B.* Foliis laciniatis, vel quinquefolius *C. B.* Major Arabicus ſive Ægyptius *Park.* Ægyptius *Veſlingii* qui vix dari cultiorem in Ægypto hortum ſcribit cui non ornamentum commodet.

Cyperus rotundus Orientalis major in Ægypto etiam copioſè provenit. *v.* Cat. Orient.

Cyprus *i. e.* Alcanna ſeu Elhanne *v.* Liguſtrum Orientale.

D.

Datura *v.* Stramonium.

E.

Elhanne *v.* Liguſtrum Orientale.

F.

Faba Ægyptia *Bod. à Stapel.* Faba Ægyptiaca Dioſcoridis affinis *C. B.* Fructus valde elegans, Faba forte Ægyp. Dioſc. *J. B.* Alpinus Fabam Ægyptiam pro Colocaſia habet. Naſcitur in paludoſis & ad fluviorum ripas in India Orientali, an in Ægypto neſcio. Nymphææ ſpeciem faciunt qui de ea ſcripſerunt.

Felfel-tavil ſeu Piper longum Ægyptium Alpini & Veſlingii qui in maritimis Africæ locis plantam ſatis frequentem eſſe ait.

Ferula Tingitana, folio latiſſimo lucido *Hort. Edinburgh.*

Ficus Ægyptia ſeu Sycomorus *Park.* Folio Mori fructum in caudice ferens *C. B.* Sycomorus *Ger. J. B.* In Ægypto & Syria copioſè.

G.

Goſſipium arboreum caule lævi *C. B.* Xylon arboreum *J. B. Park.* In Ægypto invenitur.

Gramen erucis ſive Neiem. el. ſalib. Alpini *J. B. Bont.* dactylon Ægyptiacum *C. B. Park.* In Ægypto frequens.

Gramen Stellatum Ægyptium *Veſlingii.* Dactylon Ægypt. *Park.* Qui in præcedentis deſcriptione hujus quoque meminit, Circa Heraçleam ſeu Roſſetum oppidum.

H.

Hyacinthus Mauritanicus *Cluſ. Hiſt. app.* 1. Oblongo Flore fuſco *C. B.* Ex ea Mauritaniæ parte ubi urbes Feſſa & Marochum ſita ſunt delatus eſt.

Hyoſcyamus Ægyptius *Park.* Rubello flore *Ger.* Peculiaris flore purpuraſcente *J. B.* Et Hyoſ. Syriacus *ejuſdem.* Cauliculis ſpinoſiſſimis Ægyptiacus *C. B.* Et rubello flore *ejuſdem.* Hyoſcyamus albus Ægyptius *Alpin. Æg.* & *Exot. Veſling.* Juxta Pyramides Ægyptias majores.

K.

Kali Ægyptiacum foliis valde longis hirſutis *C. B.* An Pſyllium minus.quod Gottne rubri & Botrio rubro nomine accepit C. Bauhinus? Kali tertia ſpecies *Alp. Æg.*

L.

L.

Lablab ſeu Leblab Alpini *v.* Phaſeolus.

Lathyrus Tingitanus flore amplo ruberrimo. Semina hujus Plantæ, ut & aliarum rariarum D. Alex. Balam è Tingi urbe Africæ in Angliam primus detulit.

Libanotis cachryophoros ſemine ſulcato lævi *Moriſ. prælud.* E Mauritania Tingitana attulit *D. Alex. Balam.*

Liguſtrum Orientale ſive Cyprus Dioſcoridis & Plinii *Park.* Liguſtrum Ægyptiacum latifolium & anguſtifolium *C. B.* Alcenna & Elhanne Arabum, nunc Græcis *Schenna Rauwolfii.*

Lotus Ægyptia *Alpin. exot.* Nymphæa ſeu Neufar Ægyptium *Veſling.* Nymphæa alba major Ægyptiaca ſive Lotus Ægyptia *Park.* In aquis.

Luffa Arabum ſeu Cucumis Ægyptius reticulatus *Veſling.* In horto Arabis cujuſdam prope Cayrum vidit *Veſlingius.*

Lupinus Ægyptius Sylveſtris Veſlingii *v. Cat. Oriental.* In villarum ſepibus prope Heracleam ſeu Roſſetum.

Lycium Indicum creditum Alpino *Park.* Indicum Alpino putatam *J. B.* Indicum alterum (Uſeg) *C. B.* Supra ripas rami Nili Calig. vocati 10. ab Alexandria m. p. invenit Alpinus.

Lycopſis Ægyptiaca *Park. v.* Cat. Orient.

M.

Marum Ægyptiorum *Alpin. exot.* l. 2. c. 10. Ægyptiorum Alpino *Park. app. Veſling.*

Muſa arbor *J. B. Park.* Muſa Serapionis *Ger.* Mauz Muſa *Alpin.* Palma humilis longis latiſque foliis *C. B.* In Ægypto frequens.

Melilotus Ægyptiaca *Park.* Ægyptia Alchimelech vocata *J. B.* Corniculis reflexis minor *C. B.*

Melo Ægyptius *C. B.* Melones Abdellavi Ægyptii *J. B.*

Melochia *Alpini.* Corchorus *Ger.* Plinii *C. B.* Cor ſive Melochia *J. B. Park.* Olus Judaicum nonnullis. In cibis nihil eſt ea Ægyptiis familiarius aut gratius *Alp.*

Moly Africanum umbella purpuraſcente *C. B. prod.* Africum umbella purpuraſcente *Park.*

N.

Nabca folio Rhamni vel Jujubæ *J. B.* Nabca Paliurus Athenæi credita *Alpin.* Oenoplia ſpinoſa & non ſpinoſa *C. B. Ger. emac. app.* Spinoſa & non ſpinoſa, ſive Napeca, ſive Zizyhus alba *Park.* In Ægypto folia per totum annum retinet, at in Creta, obſervante Bello per hyemen amittit. Ægyptus, Syria & Armenia hac arbore abundant *Bellon.*

Nymphæa ſeu Nuphar *Veſt. v.* Lotus.

O.

Ocimum Ægyptium Alpini *Riban.* dictum *Herm. Hort. Acad. Leyd.*

Oenoplia *v.* Nabca.

Oenanthe altera minor Africana *Park.* Item tenuifolia altera Africana *ejuſdem* p. 895. E Barbaria Africæ regione attulit *Gulielmus Boëlius.*

P.

Paliurus Athenæi Alpino *v.* Nabca.

Palma *Ger. C. B.* vulgaris *Park.* Major *C. B.* Dactylifera major vulgaris *Jonſt.* In Ægypto & Syria.

Papyrus Nilotica *Ger. J. B.* Antiquorum Nilotica *Park.* Nilotica ſeu Ægyptiaca *C. B.* Provenit etiam in Siciliæ paluſtribus *v.* Cat. Sicularum rariorum *P. Boccone.*

Phaſeolus indicus ruber *Bontii.* Piſum Americanum coccineum, aliis abruſ. *J. B.* Abruſ. *Alpini de Plant. Ægypt.* Glyzyrrhiza Indica vulgò.

Phaſeolus Lablab Alpini *J. B.*

Phaſeolus Ægyptiacus nigro ſemine *C. B.*

Polium montanum pumilum tenuifolium Africum *Park.* A Guil. Boëlio circa Tuniſium urbem collectum eſt.

R.

Ruta Sylveſtris quæ dici ſolet Harmala *J. B.* Juxta Alexandriam *v.* Cat. Orient.

S.

Sabina Ægyptia *Lob.* eſt Abrotanum fœmina Sabinæ folio *C. B.*

Sebeſten *v.* Cat. Orient. Non enim in Ægypto tantum ſed & in Aſia provenit.

Secamone *Alpin. Ægypt.* Apocynum anguſto Salicis folio *C. B.* Apocyno affinis Secamone flore albo *J. B.* An Apocyni Secundi ſpecies altera *Cluſ.*

Sena *J. B. Ger.* Alexandrina *Park.* Alexandrina ſive foliis acutis *C. B.* In Syria, Perſia, Arabia naſci aiunt, unde Alexandriam defertur.

Seſamum *J. B. C. B. Park. & aliorum.* Myagrum Ægyptiacum *Zanoni.*

Sesban *Alpini. Ægypt.* Sesban ſive Securidaca Ægyptia articulata *Park.* Galega Ægyptiaca ſiliquis articulatis *C. B.*

Sinapi maritimum Ægyptiacum *Alpin. exot.* l. 2. c. 19. Ex ſeminibus Ægypto delatis enata eſt.

Sonchus froticoſus Africanus petræus ſpinoſus *Park.* In petroſis circa Tunis & Sapphi à Boëlio inventus & ad Parkinſonum delatus eſt.

Sophera Alpini & Bellii *J. B.* Galegæ affinis Sophera dicta *C. B.* Sophera ſeu ſecuridaca Ægyptiaca villoſa *Park.* Hoxocoquamoclit *Cam. hort.*

Stramonium minus flore geminato purpurante *Park.* Fructu rotundo, foliis per ambitum Xanthii modo inciſis *Col.* Solanum fœtidum pomo ſpinoſo rotundo, ſemine pallido *C. B.* Datura Ægyptia *Veſling.* Contarena *Alpin. exot.*

Stratiotes Ægyptia *J. B.* Aquatica vera Dioſcoridis & Ægyptiaca *Park.* Lenticula paluſtris Ægyptiaca, ſive Stratiotes aquatica foliis Sedo majore latioribus *C. B.* Aquis innatat ſine radice, ut aiunt.

Stratiotes Ægyptia Dioſcoridis *Veſling.* Hæc & ſuperior vel Nilo, vel foſſis inde deductis ſupernatat, nec radice in terram demiſſa firmatur, ſed huc illuc fluitat.

Sycomorus *v.* Ficus.

T.

Tamarindus *Ger. Park. J. B.* Siliqua Arabica quæ Tamarindus *C. B.* Ex Æthiopia in Arabiam & Ægyptum delatam nonnulli volunt.

Tamariſcus Ægyptia gallifera *J. B.* Tamaria Ægyptia arbor *C. B.* Ægyptia gallas ferens *Park.* In Ægypto locis humidis ſecus flumina oritur, non raro etiam aridis & fabuloſis. *Bellon.*

Thlaſpi Alexandrinum *C. B. Park.* Alexandrinum Cortuſi *J. B.* Verum Dioſcoridis *Zanoni.*

U.

Uzeg arbor *v.* Lycium Indicum.

Z.

Zatar-hendi Origanum Indicum Alpini & Veſlingii Origano congener Zatar-hendi *C. B.* Zatarendi herba *J. B.* Planta Ægyptiaca non eſt, ſed ex India illuc deportata, ut nomen arguit. Cœterum, Zatarendi *Alpin.*

Stirpium Creticorum rariorum Catalogus.

A.

ABellicea Cretica ſive Santalus adulterina *J. B.* Pſeudo-ſantalus Cretica, Abelicea dicta *Park.* Pſeudo-ſantalum Creticum *C. B.* In montibus Leucis, eorumque jugis altiſſimis.

B. Abſinthium Ponticum Creticum grati odoris *C. B. prod.* In viridi ſaltem amaritudo nulla percipitur, unde ab Aſinis, pecoribus, omnibuſque Brutis valde expetitur.

Acanus Theophraſti *Park. vid.* Agavanus Cretenſium.

Acanthus ſpinoſus in agris & juxta ſemitas frequens eſt *Bellon.*

Acetoſa Cretica ſemine aculeato *C. B.* Mihi deſcriptiones utriuſque conferenti eadem aliquando viſa eſt cum Acetoſa Neapolitana Ocimi folio βικεφαληφόρῳ *Col.* Verum peritiſſimus Botanicus D. *Jacobus Breynius*, qui utrumque coluit, & obſervavit, nos erroris inſimulat, & diſtinctæ ſpecies cum ſint, à me perperam confundi ſcribit; cui non repugno, cum nec initio id fidenter, ſed timide affirmaverim.

Achlades *Bellon.* Pyri ſylveſtris genus.

Adrachnæ *Park.* Theophraſti *J. B.* Arbutus folio non ferrato *C. B.* Adracla Græcis. In Creta, montibus Leucis, & alibi inter ſaxa.

Aga Cretenſium *C. B.* i. e. Silybum minus Bœticum *Park.* Carduus lacteus peregrinus Camerarii *J. B.* albis maculis notatus exoticus *C. B.*

Agaſuga *Bellon.* i. e. Pyra ſylveſtria Cretica.

Agavanus Cretenſium i.e. Acanus Theophraſti *Park.* Agavanus Cret. forte Acanys Theophr. *Hon. Belli* ep. 5 ad Cluſium, & *Ponæ* Ital. Carduus latifolius echinos obſoletæ purpuræ ferens *C. B.* Vulgaris eſt notitiæ in Creta.

Agrio-

Agriocinara Cretica *Ponæ Ital.* Cinara Sylveſtris Cretica *C. B. Park.* Carduus Agriocinara Cretenſium, ex quo Coſtus niger Officianarum *J. B.* Agrioanzinari Cretenſium *Bello* ep. 2. ad Cluſium. An Cinara ſylv. Bætica *Cluſ. cur. poſt.* Supra *Chiſama* arcem *Bellon.*

Agriomelea *Bellonii*, quam in Cretæ montibus inveniſſe ſcribit, exiguorum malorum Pyris formâ ſimilium feracem, an Cotoneaſter *Geſn. v. Cat. gen.*

Agrioſtari ſeu Frumentum ſylveſtre Creticum *Ponæ. Ital. Bell.*

Althæa fruticoſa Cretica *Park.* Frutex 3 *Cluſ.* Hanc cum Althæa fruteſcente Bryoniæ folio *C. B.* f. fruteſcente folio acuto, flore parvo. Althæa Olbiæ perperam dicta, eandem putamus. V. *Cat. Sic.*

Ammi Creticum *Ger. Park.* Creticum aromaticum *Lob.* odore Origani *J. B.* Alterum ſemine Apii *C. B.* Semen ex Alexandria Ægypti adfertur.

Anchuſa humilis *Alpin. exot.* Humilis Cretica *Park.* In locis montoſis & ſylvis Cretæ.

Anemone tenuifolia Cretica albo magno flore *C. B. prod.*

Anthyllis falcata Cretica *Park.* Trifolium falcatum *Alpin. exot.*

Anthyllis *Alpin. exot.* In maritimus copioſe. Accedit ad Anthyllidem à Cluſio & J. Bauhino deſcriptam.

Arachydna aut Aracoides Honorii Belli, *J. B.* Cretica *Park.* Viciæ ſimilis, ſupra in fráque terram fructum ferens *C. B.*

Archontoxilon, i. e. Ebenus Cretica.

Arcturus Creticus Belli *v.* Blattaria piloſa Cretica.

Ariſtolochia polyrrhizos *v.* Piſtolochia.

Ariſtolochia clematitis ſerpens *C. B.* Reliqua Synonima *v.* in *Cat. Hiſt.* Arbores ſcandit Ephedræ aut Smilacis modo *Bellon.*

Arundo graminea aculeata *Alpin. exot.* In locis humidis ſupra terram ſerpit.

Aſclepias Cretica Cluſii *J. B. Park.* Siliquâ bifido mucrone *C. B.*

Aſcolim-

Aſcolimbros Bellonii non eſt (ut puto) Scolymus chryſanthemos ſ. Eryngium luteum Narbonenſium, ſed Carduus Siculus chryſanthemus procerior caule eduli *Hiſt. noſt.* p. 258.

Aſcyroides Cretica *Alpin. exot.* Cretica major *Park.* Hanc plantam in hiſt. noſt. eandem putavimus cum Androſæmo Conſtantinopolitano flore maximo *Wheeler*; icontamen non reſpondet, at neque deſcriptio: ut nunc muratâ ſententiâ diverſam ſuſpicer.

Aſpalathus ſecundus Creticus *Alp. v.* Cytiſus.

B.

Blattaria piloſa Cretica ſive Arctos quorundam *J. B.* Verbaſcum humile Creticum laciniatum *C. B.* Verbaſculum ſylv. Creticum *Alpin. exot.* Blattaria Cretica incana, rotundo laciniato folio *Park.* Arcturus Creticus. *Belli.* Provenit inter ſaxa & ſuper parietes.

Blattaria Cretica ſpinoſa *Park.* Leucoium Creticum ſpinoſum *Cluſ. J. B.* Creticum ſpinoſum incanum luteum *C. B.* Spinoſum Creticum *Ger.* Spinoſum cruciatum *Alpin.* Glaſtivida Cretenſium *Belli.*

Borago Sylveſtris annua Cretica *Zanoni.* Bugloſſum procumbens annuum pullo minimo flore *Moriſ. prælud.*

Borago muralis variegata, flore odorato Cretica *Zanoni.* Bugloſſum Luſitanicum bullatis foliis *Moriſ. prælud.* In muris urbis Candiæ ex ipſis petrarum fiſſuris exit.

Borago ſylveſtris Cretica flore rubro cremeſino perennis, eadem videtur Echio Cretico latifolio rubro *C. B.*

Bugloſſum Creticum verrucoſum, perlatum quibuſdam *Schol. Bot.* ſeu Hort. *Reg. Par. Tournefort.*

Bryonia Cretica *Pon. Ital.* Cretica dicoccos *Park.* Cretica maculata *C. B.* Alba maculata *J. B.* In Creta frequens eſt.

Buphthalmum Creticum Cotulæ facie *Breyn.* Flore luteo & albo.

C. Calamintha

C.

Calamintha Cretica *Cam.* Folio & flore parvo incana *J. B.* Incana Ocimi foliis *C. B.* Minor incana *Park.* Montana vulgaris *Ger.* Ex ſemine è Creta miſſo Camerario ſuccrevit. Lobelius tamen cautibus Linguagotticis calidarumque regionum innaſci ſcriptum reliquit.

Calochierni carduus Cretenſibus *J. B.* Atractyli & Cnico ſylveſtri ſimilis *C. B.* Forte Atractylis major è cujus caulibus mulieres fuſos efficiunt. Atractylidi vulgari ſimilis, not tamen eadem *v.* Hiſt. noſt. p. 304.

Caloſchirrida *v.* Echinus Creticus *Alpin.*

Carduus pinea Theophraſti *Alpin. exot.* pinea ſeu Ixine Theophraſti *Park.* Chamæleon albus gummi ut maſtix ferens *Bell.*

Carduus Eryngoides capite ſpinoſo *Alpin. exot.*

Caryophillus arboreſcens Creticus *C. B.* Sylveſtris arboreus *Alpin. exot.* Noſtrâ ſententiâ. Betonica coronaria arboreo Cretica *J. B.* In montibus Cretæ oritur.

Caucalis Cretenſium & Græcorum i. e. Seſely Creticum.

Ceraſus Alpina Cretica, ſeu Idæa *Alp. exot.* Vitis Idæa Cretica elatior *Park.* Agrifolii folio. In monte Idâ Cretæ familiaris eſt. An Agriomelea Bellonii.

Chamæceraſus Idæa *Alp. exot.* Vitis Idæa Cretica humilior *Park.* In monte Ida naſcitur.

Chamæciſtus *Alpin. exot.* An Chamæciſtus Serpylli folia floribus carneis *C. B.* Serpylli folio, flore carneo *J. B.* 7. *Cluſ.*

Chamædaphnoides Cretica, ſeu Laureola Cretica humilis *Alp. exot.* Chamædaphnoides ſive Laureola Cretica *Park.* In Cretæ montanis.

Chamædrys ſpinoſa Cretica *Park.* Spinoſa *C. B. J. B.* Ex horto Bembi Patavio accepit *C. B.*

Chamægeniſta Cretica *C. B. Park.* Parkinſonus pro Spartio Cretico *Alp. ex.* hanc habet.

Chamæpeuce Plinii *anguillaræ*, *v.* Stœba fruticoſa Cretica.

Chamæpytis fruticoſa Cretica, *v.* Stœbe capitata Roſmarini foliis Ponæ.

Chryſocome

Chriſocome Cretica *Cluſ.* Elichryſum Creticum *C. B.* Stantolina Cretica *Alpin.* Hanc plantam pro Stœchade citrina alteri inodoræ Lobelii affini capitulis brevioribus *J. B.* habemus *v.* Hiſt. noſt. p. 282. In montoſis Cretæ.

Cichoreum ſpinoſum Creticum *Park. Pon.* In maritimis, inque ſiccis collibus & arenoſis locis. Hanc ſpeciem in Sicilia obſervavimus. *v. Cat. gen.*

Ciſſampelos ramoſa Cretica *Park.* Helxine Ciſſampelos ramoſa Cretica *Ponæ.* Convolvuli ſpecies.

Ciſtus Ledon Cretenſe *C. B.* Led. latifolium Creticum *J. B.* Ladanifera Cypria *Park.* Item ledanifera Cretica vera *ejuſdem.* Ledon 4 Cluſſii *Ger.* Deſcriptionem *v.* in *Alpin. exot.*

Clinopodium Creticum *Alpin. exot.* Perſimile eſt, ſi odorem excipias, Acino vulgari.

Cneoron album folio Oleæ argenteo molli *C. B. v.* Convolvulus rectus odoratus *Ponæ.*

Cnicus ſingularis *Alpin. exot.* alter Creticus *Park.*

Colutea Scorpioides Cretica odorata. *Alpin. exot.*

Convolvulus ramoſus incanus, foliis Piloſellæ *C. B.* Helxine Ciſſampelos ramoſa Cretica *Pon. Ital. Park.*

Coris legitima Cretica Dioſcoridis *Belli Ger. emac. Park.* Item Coris Matthioli *ejuſdem.* Nos enim has non diſtinguimus. C. Hypericoides quorundam *J. B.* Lutea *C. B.* In collibus fœcundis copioſè.

Coronilla fruteſcens coronata glauco folio Cretica, flo. luteo odorato *Breyn. prod.* 2.

Cyanus arboreſcens longifolia *Alpin. exot.* In montanis Cretæ naſcitur.

Cyanus arboreſcens altera, Styracis folio *Alp. exot.*

Cyanus tomentoſus *Alp. exot.*

Cyanus lanuginoſus ſpinoſus Creticus, & Cyanus fruticoſus Creticus, *v.* Stœbe fruticoſa Cret.

Cynara ſylveſtris Cretica *C. B. Park.* Carduus Agriocinara Cretenſium, ex quo Coſtus niger Officinarum *J. B.* An Cinara ſylv. Bœtica *Cluſ. cur. poſt.* Supra Chiſami arcem, &c. *v.* Bellon.

Cynogloſſum Creticum ſecundum Cluſii *J. B.* Creticum alterum *Ger.* Cret. latifolium *Park.* Latifolium fœtidum *C. B.* Cynogloſſæ alteri mediæ fructu cotylode ſive Lychniode *Col.* eadem videtur planta.

Cynogloſſum

Cynogloſſum Creticum anguſtifolium *Park.* Creticum argenteo anguſto folio *C. B.* Creticum 1. *Ger.*

Cyperus rotundus odoratus Creticus *Cam. Park.*

Cytiſus Creticus, Aſpalathus ſecundus *Alpino* dictus. In loco *Fraſchia* dicto propè Cretam urbem. Aſpalathus 2. Dioſcoridis Bello & aliis. *v. Cat. gen.* Acacia trifolia.

D.

Daucus Creticus *Ger.* Creticus verus Dioſcoridis *Park.* Non videtur diverſus à Dauco Cretico ſemine hirſuto *J. B.* ſeu Dauco montano umbellâ candidâ *C. B.* *v. Hiſt. noſt.* p. 463.

Daucus ſtellatus *Alpin. exot. Park.* Planta à Dauco longè diverſa eſt.

Daucus tertius Dioſcoridis Bello *Ponæ Park.* Tertius folio Coriandri, flore luteo *J. B.* Creticus nodoſus umbellâ luteâ *C. B.*

Dictamnus Creticus *C. B. Park.* Dict. Cretica ſeu vera *J. B.* Dictamnum Creticum *Ger.* In monte Ida; in ſcopulorum fiſſuris, nec uſquam alibi.

Dorycnium Creticum *v.* Convolvulus rectus.

Dorycnium Dioſcoridis fortè Ponæ *Park.* Jaceæ oleæ folio affinis *C. B.* Item Cneoro albo affinis *ejuſdem.* Hujus ſemina è Creta ab Honorio Belli ad ſe miſſa *Lagochimicæ* nomine ſcribit C. Bauhinus in Pinace.

E.

Ebenus Cretica *Alpin. exot.* Cytiſus Creticus incanus ſive Ebenus Cretica Belli *Park. C. B.* Barba Jovis lagopodoides Cretica fruteſcens incana, flore ſpicato purpureo amplo *Breyn.*

Echinopoda Cretenſibus *J. B.* Echinop. frutex Creticus *Park.* Geniſta ſpartium ſpynoſum aphyllum, tribus aculeis ſemper junctis, floribus luteis *C. B.*

Echinus Creticus *Park.* Echinus ſeu Tragacantha alia humilior & ſpinoſor *Alpin. exot.* Græci *Caloſchirrida* vocant.

Echium

Echium Creticum latifolium rubrum *C. B. Park.* An Echium Candiæ flore pulchre rubente *J. B. V. Cat. gen.*

Echium Creticum *Alp. exot.* Creticum album *Park.* Echium pumilum flore luteo *C. B. Park.* h. e. Echium flavo flore *Cluſ. cur. poſt.* huic idem videtur.

Echium nigro flore eleganti *Alp. exot.* Creticum nigrum *Park.*

Echium Creticum anguſtifolium rubrum *C. B. Park.* Creticum 2. *Cluſ.* Habetur & in Sicilia. *Cat. Gen.*

Equiſetum montanum Creticum *Park. Alpin. exot.* In montanis Cretæ. Flores fert circa virgarum geniculos, quo ab Equiſetis differt. Tragi ſive Uvæ marinæ ſpecies eſt.

Eruca maritima Cretica ſiliquâ articulatâ *C. B.* E Creta Honorius Belli miſit.

Eryngium trifolium *Alpin. exot. Park.* In locis aſperis.

Eryſimum Dioſcoridis *Zanoni* Eryſimi annui Creticæ nomine miſſum.

F.

Fœnum Græcum ſylveſtre policeration majus Creticum *Breyn. Cent.*

Frutex pulcherrimus *Belli* i. Stœbe fruticoſa latifolia Cretica.

Fumaria major Cretica *Park.* Altera tenuior Syriaca *Cam.* minor folio oblongo capillaceo *C. B.* Capnos Cretica *Cluſ.* An Fumaria noſtra major ſcandens ?

G.

Gaiderothymum *v.* Stachys ſpinoſa Cretica.

Galaſtivida Cretenſium prima *v.* Blattaria ſpinoſa.

-------- Altera *v.* Tithymalus marit ſpinoſus.

Gallium montanum Creticum *Alpin. exot. Park.* In montanis Cretæ abundat.

Geniſta arborea Cretica, foliis ſemper virentibus *Zanoni.*

H.

Habbures *Cam.* i. e. Leontopodium Creticum aliud.

Hedyſarum argenteum, *Alpin. exot.* argenteum Creticum *Park.*

Hieracium

Hieracium majus Creticum *Park.* Majus folio Sonchi, ſemine curvo *C. B.* Item Sonchus aſper laciniatus Creticus *ejuſdem.* Chondrillæ Creticæ nomine miſſa, ſemine criſpo *J. B.* Sonchus Creticus foliis laciniatis vulgò.

Hieracium parvum Creticum *Park. Cluſ.* Minor flore, ex albo carneo *C. B.* Intybaceum, non ramoſum *Pona.*

Hieranzune Cretenſium eſt Lotopiſum Belli. *v. Cat. gen.*

Hippomarethrum Creticum *C. B. prod. Park.* Daucus 3. Creticus, aliis Seſeli nodoſum & Hippomarathrum *Pona. Ital.* Κυρνόποδι vulgo, i. e. Pedes corvini. Fœniculum magnum ſive Hippomarathrum *J. B.* Libanotis cacrhyoph. ſem. fulcato aſpero *Moriſ. Hiſt.*

Holoſteum ſive Leontopodium Creticum *C. B. Park. Ger.* Leontopodium Cretenſe *Cluſ.*

Holoſteum *Alpin. exot.* quod ab Holoſteo Salmanticenſi Cluſii differre contendit. Plantago anguſtifolia minor lanuginoſa Cretica vel Syriaca, pediculis & capitulis maturitate ad terram inflexis *Breyn. prod.* 2.

Horminum comâ rubrâ *J. B.* vulgo Horm. Creticum.

Horminum minus ſupinum Creticum *Cluſ. C. B. Park.*

Hyoſcyamus Creticus luteus major *C. B.* Luteus minor *J. B.* Creticus *Park.* Creticus alter *Cluſ.* Hæc ſpecies in Italia & Gallia Narbonenſi occurrit. *v. Cat. gen.*

Hyoſcyamus aureus *Alp. exot.* Creticus luteus minor *C. B.* 4. ſ. albus Creticus *Cluſ.* Albus Creticus *Ger. emac.*

Hyſſopus Græcorum *Alpin. exot.* An Hyſſopus Origani folia *Daleeh. J. B.*

J.

Jacea incana Cretica, flore luteo medio purpureo, ſquamis in molliores ſpinas abeuntibus *Herman. Hort. Lugd. Bat.*

Jacea Cretica *Park.* laciniata ſquammata *C. B.* Squammata Cretica, quibuſdam Scabioſa Cretica dicta *J. B.*

L. La-

L.

Lachryma *Jobi* Seſamum annuum *Zanon.* in Creta copioſe.
Lagochymica Cretenſium eſt Dorycnium Dioſcoridis *Ponæ.* Bellonius Heliochryſon vulgò *Lagochymithia* dictum ſcribit, quòd leporibus cubilia grata præbeat.
Lamium fruticoſum non maculatum Creticum *Zanon.*
Laurus Sylveſtris Cretica *Alpin. exot. Park.*
Lazegiri Cretenſium i. e. Lycium Creticum alterum.
Leontopetalon craſſa radice *Bellon.* In Ida monte hyeme floret.
Leontopodium Creticum *Cluſ. v.* Holoſteum.
Leucoium Creticum Thlaſpifolium *C. B.* Marinum Creticum majus *Park.* Marinum Creticum 1 *Cluſ.*
Leucoium Creticum floribus minoribus *C. B.* Creticum minus *Park.* Marinum Creticum 2 *Cluſ.*
Leucoium Creticum foliis oblongis crenatis *C. B.* Creticum oblongis foliis crenatis *Park.* Creticum 3 *Cluſ.*
Leucoium Creticum minimum folio ſubrotundo *C. B.* Creticum cæruleum marinum *Alpin. exot. Park.*
Leucoium album odoratiſſimum folio viridi *C. B. prod.*
Leucoium Creticum luteum utriculato ſemine *Alp. exot. Park.*
Leucoium ſpinoſum Creticum *Cluſ.* Eſt Blattaria ſpinoſa ſeu Glaſtivida.
Libanotis Apii folio ſemine aſpero *C. B.* Theophraſti Apii folio Cretica *Park.* Roſmarinus foliis Selino ſimilibus *Bell.*
Linaria Cretica latifolia major *Cluſ. Park.* Latifolia triphylla major *C. B.*
Linaria Cretica anguſtifolia *Cluſ. Park.* Quadrifolia, exigius floſculis cinereis *C. B.*
Linaria perennis fruticoſa Cretica *C. B. prod.* Cui & Linaria latifolia Dalmatica magno flore dicitur.
Linum arboreum *Alpini exot.* Arboreum Creticum luteum *Park.*
Lotus πολυκέρατος Cretica fruticoſa argentea, ſiliquis longiſſimis propendentibus rectis *Moriſ. Hiſt.*
Lotopiſum Belli i. Lotus edulis Creticus *v.* Cat. gen.
Lutea maxima Cretica Honor. Belli *J. B.* Luteola herba folio Cannabino *C. B.* Maxima Cretica fœcunda & ſterilis *Park.* Cannabis lutea fertilis & ſterilis Contareni *Alpin. exot.* Inter montes in Aquis

naſcitur, loco quodam Ὀφ. Μίσγμα dicto, tertio ab urbe Cydonia lapide *Bell.*

Lychnis Cretica anguſtifolia *Park.* Hirſuta anguſtifolia Cret. *C. B.* Ocymoides flore rubro minus Creticum *J. B.* ſylv. 7. *Cluſ.*

Lychnis Auriculæ urſi face *C. B.* Sylv. latifolia Cluſii, ſive muſcipula Cretica Auriculæ urſi facie *J. B.* Sylv. latifolia Cluſii *Ger. emac.*

Lychnis viſcaria maxama Cretica *Alpini.* Viſcaria maxima Cretica Alpini *Park.*

Lycium Cretenſe ſive Berberis Cretica *J. B.* Creticum primum Belli *Park.* Berberis Alpina Cretica. *C. B.* Lycium Creticum ſ. Berberis Alpina Belli *Bon.* In montium altiſſimorum convallibus.

Lycium Creticum alterum *Park.* Λαζηγίρι & Πέτρο αμύγδαλα *i. e.* Amygdala Petræa, licet cum Amygdalis nihil commune habeat *Bell.* Ep. 1.

M.

Majorana Cretica vel Syriaca *C. B.* Marum Creticum *Alp. exot.* Syriacum *A. Lob. Ger.* Syriacum vel Creticum *Park.*

Mandragora mas & fœmina *Bellon.* In monte Ida. Quæ quamvis in Hiſpania etiam & Italia ſponte proveniant, quia tamen rariores ſunt omittere nolui. Vid. *Cat. Hiſpan.*

Marrubium Creticum *Ger. Park.* Album anguſtifolium peregrinum *C. B.* Album anguſtiore folio *J. B.*

Marrubium Creticum anguſtifolium inodorum *Park.* Album peregrinum brevibus & obtuſis foliis *C. B.*

Marrubium nigrum Creticum *Alp. exot. Park.* Planta Alpino deſcripta imperfecta erat, abſque flore & ſemine.

Melilotus quædam Cretica *Alpin. exot.* Eſt lotus Siliquis ſingularibus vel binis tenuis *J. B.*

Melilotus veſicaria Cretica *Hort. Altdorf.*

Meum alexiterium Creticum *Park. Alpin. exot.*

Millefolium Creticum *J. B.* Incanum Creticum *C. B. Park.* Stratiotes Millefolia *Belli ep.* 2. ad Cluſium *Alpin. exot.* Parkinſonus ex hac planta duas facit: priorem Millefolium incanum Creticum vocat, poſteriorem Stratiotem Millefoliam Creticam.

Muſcipula Cretica &c. *v.* Lychnis.

Myrrhis

Myrrhis ſyl. Cretica nodoſa, ſeminibus aſperis annua, ſemine ſtriato aſpero oblongo, nodoſa. *Moriſ.*

N.

Napus Sylveſtris Cretica *Park. C. B.* Bunias agreſtis Belli, qui ad *C.* Bauhinum è Creta miſit.

Nardus montana Cretica *Alpin. exot.* An Valeriana Cretica tuberoſa *Park?* Nardus Cretica *Belli.* Cretica Filipendulæ radice *C. B?* Nardus tamen Cretica *Belli* diverſa videtur à Nardo montana Cretica *Alpini.*

Nigella Cretica *C. B.* Melanthium ſimplici flore Creticum *Cluſ.* Nigella Cretica odoro ſemine *Park.*

Nigella Cretica latifolia odorata *Park. Ponæ Ital.* Alba ſimplici flore *Alpin. exot.*

Nigella Cretica altera tenuifolia odorata *Park.* Cretica folio Fœniculi *C. B.*

Nigella Cretica odorata, foliis Lini, ſeminibus biformibus *Park.* Malè inſcribitur Nigella. Melanthium odoratum *Alpin. exot.*

O.

Oenanthe ſtellata Cretica *Alpin. exot. Park.*

Oenanthe Cretica prolifera *Park.* Apula prolifera *C. B.*

Oleander Creticus fruticoſus major fœtidus *Zanon.*

Origanum Creticum *J. B. Ger.* Sylveſtre Syriacum *Lob.* Onites *C. B. Matth.*

Ornithogalum Creticum & Pannonicum flore albo *J. B.*

P.

Pæoniæ duo genera candido flore *Bellon.* Græcis Pſiphædile. In omnibus humidis vallibus montis Idæ.

Paſtinaca tenuifolia Cretica, radiis umbellæ Gingidii longioribus *Moriſ.*

Petromarula Cretica i. e. Rapunculus Creticus.

Petroſelinum Creticum *C. B. Park.* Agriopaſtinaca vulgò in Creta *Bello* ep. 5. ad Cluſium, cui Buſalinon Plinii videtur. In montibus Cretæ & Dalmatiæ. Duplex genus eſt, radice nigra, & rad. ruffa.

Phyllitis alata ſive ramoſa *Alpini*; an & quomodo ab Hemionitide multifida differat inquirendum. Alpini icon plantam diſtinctam repræſentare videtur: & Jac. Breynius longè diverſam eſſe ait.

Piſtolochia Cretica *C. B.* Cretica ſemper virens *Park.* Ariſtolochia Piſtolochia altera *J. B.* Diverſa eſt a Piſtolochia Virginiana, Polyrrhizos dicta, ex accurata obſervatione & deſcriptione ad me miſſa incomparabilis Botanici *D. Joan. Banniſter.* triſtiſſimo caſu nuper in Virginia rebus humanis erepti.

Polium latifolium incanum Creticum *C. B. Park.* Ad Polium montanum luteum vulgare proximè accedere videtur. Circa Cydoniam urbem.

Polium anguſtifolium Creticum *C. B. Park.* Erectum Creticum & fortè fruteſcens Dioſcoridis Ponæ. In Creta ad maris littora frequens.

Polium gnaphaloides *Alpin. exit. Park.* Gnaphalii marini ſpecies eſt. In maritimis Cretæ. Gnaphalium marinum Cluſii eſſe pernegat.

Polygonum Creticum Thymi folio *C. B. Park.* Non multum abludit à Poligono noſtrate parvo, flore albo verticillato.

Pimpinella ſpinoſa *Park.* Poterio affinis folio, Pimpinella ſpinoſa *C. B.* Poterium quibuſdam, ſive Pimpinella ſpinoſa *J. B.* Poterion Lobelii ſive Pimpinella ſpinoſa Camerarii *Ger.* Stœbe legitima Dioſcoridis *Bello.* In Creta perpetuo viret, & multos annos durat.

Poterium *Alpini.* Tragacanthæ ſpecies, multis Cretæ Inſulæ in locis invenitur.

Pſeudoſtachys Cretica *v.* Stachys.

Pſeudociſtus Ledum *Alpin. exot. 1. Park.*

Pſeudociſtus Ledon alterum *Alpin. exot. 2. Park.*

Pſeudodictamnus Cydoniæ ſeu Pſ. 2. Theophraſti Ponæ, *i. e.* Pſeudod. acetabulis Moluccæ *C. B.*

R.

Ranunculus echinatus Creticus *Park.* Stellatus echinatus Creticus *C. B.* Creticus echinatus latifolius *Alpin exot.*

Ranunculus Creticus albo flore, majore quam Papaveris Rhœados. *J. B.*

Ranunculus Creticus latifolius *Cluſ. Park. Ger. Emac.* Aſphodeli radice Creticus *C. B.*

Ranunculus Creticus grumoſa radice, flore niveo *Cluſ.* Grumoſa radice, flore niveo *C. B.*

Rapun-

Rapunculus Creticus ſeu Pyramidalis alter *C. B.* Creticus Petromarula *J. B.* Petrom. Cretica ſive Rapunculus Creticus *Park.* Petromarula ſ. Lactuca petræa *Pon. Ital. Bell.*

Roſmarinus Selini folio *Bell. v.* Libanotis &c.

Roſmarinum Stœchadis facie *Alpin exot.* Potiùs Euphraſia Stœchadis facie.

Rubia argentea Cretica *Alpin. exot. Park.* Cruciata argentea.

Rubia arboreſcens Cretica *Alpin. exot.* Lævis arboreſcens Cretica *Park.* An & quomodo à Rubia Sylvatica lævi *J. B.* differat inquirendum.

S.

Salvia Cretica pomifera *Cluſ. Ger.* Baccifera *C. B.* Gallifera *J. B.* Major Cretica latifolia & anguſtifolia, aurita & non aurita, pomifera & non pomifera, nam ſpecie conveniunt, Bellonius poma hæc eſui apta eſſe ſcribit, eáque ruſticos legere ſolere, iíſque plenos Saccos in proximas urbes venum deferre: quod mirum, cùm nihil aliud ſint quàm Gallæ, ſeu morboſi tumores ab Inſectis excitate *Park.*

C. Salvia Cretica anguſtifolia, *Cluſ.* Tenuifolia *J. B.* Anguſtif. ferrata *C. B.* Auguſtif. non aurita *Park.* Semine è Creta accepto nata eſt.

Sandalida Cretica eſt Lotus ſiliquis quadripinnat. in *Catal. general.*

Santolina Cretica *Alpini. v.* Chryſocome.

Satureia Cretica *C. B. Ger. emac.* Cretica legitima *Park.* Thymbra Græca *J. B.* Hoc genus Alpinus Tragoriganum eſſe contendid, non Thymbram, cujus rationes vide.

Satureia Cretica ſpinoſa *Ponæ.*

Saxifraga Cretica prior *Park.* Saxifraga *Alpin. exot*

Saxiphraga altera *Alpin. exot.* Cretica altera *Park.*

Scabioſa arborea *Alpin. exot.* Arborea Cretica *Pod.* Peregrina *Ger.* Frutiçoſa, folio non diſſecto peregrina *J. B.* Stellata folio non diſſecto *C. B.*

Scammonea macrorrhizos *Alpin. exot.*

Scandix Cretica major *C. B. prod. Park.* Pecten Veneris Creticum *J. B.*

Scordium

Scordium alterum languinoſum verticillatum *C. B.* Scordotis Plinii prima *Park. Ponæ.* Tomentoſa Cretica *J. B.*

Scordotis Cretica *C. B. prod.* Altera Plinii *Ponæ. Ital. Park.* Scordotis *Alpin. exot.*

Scrophularia Cretica 1. *Cluſ.* Cretica latifolia *Park.* Indica *Ger.* Foliis Filicis modo laciniatis, vel Ruta canina latifolia *C. B.*

Seſely Creticum majus *C. B. Ger.* Creticum, ſive Tordylium majus *Park.* An Caucalis Luſitanica *Alpin. exot.*

Seſeli Creticum minus *v. Cat. gen.*

Seſeli Cretenſe nodoſum *Park.* Myrrhis Sylveſtris Cretica nodoſa, ſaminibus aſperis *Hiſt. noſt.* p. 432.

Sideritis viſcoſa Cretica bitumen redolens *Zanoni.* Glutinoſa bitumen redolens *Moriſ. Prælud.*

C. Siler Creticum quibuſdam, foliis Cicutæ, ſemine longo criſpo *J. B.* Sil. 2. foliis Cicutæ *C. B.*

Solanum ſomniferum Antiquorum *Alp. exot.* Somniferum Antiquorum verum *Park.* Item Solanum ſomniferum *Park.* Virtiicllatum *J. B.* Somniferum verticillatum *C. B.* In Cretæ locis maritimis.

Spartium Creticum *Alpin. exot. Park.*

Spartium ſpinoſum Creticum *Alpin exot. Park.*

Spartium ſpinoſum ſecundum *Alpin. exot.* Spinoſum aliud Creticum *Park.*

Spica trifolia Cretica *Alpin. exot.*

Stachys Cretica major ſeu latifolia *Hort. Reg. Par. Tournefort. Cat.*

Stachys Cretica *C. B.* Stachys ſive Pſeudoſtachys Cretica *Park. C. B. prod.*

Stachys ſpinoſa *Park.* Spinoſa Cretica *C. B. Ger.* Spinoſa *J. B. Gaidarothymo*, i. e. Aſininum Thymum ruſticis Cretenſibus.

Staphis agria in monte Ida paſſem ſponte provenit *Bellon.* v. *Cat. gen.*

Stœbe fruticoſa latifolia Cretica *Park.* Frutex rotundo argenteo folio, Cyani flore *C. B.* Cyanus fruticoſus Creticus Candiæ *Ponæ Ital.* Frutex pulcherrimus *Bello ep.* 2. *ad Cluſ.*

Stœbe

Stœbe ſpinoſa Cretica *Park.* Spinoſa *J. B.* Spinoſa maritima *C. B.* Cyanus ſpinoſus Creticus *Ponæ & Alp.*

Stœbe anguſtifolia Cretica i. Stœbe capitata Roſmarini foliis *Ponæ.* Forte Chamapeuce *Alpin. exot.* Chamæpitys fruticoſa Cretica *Belli.* Jacea fruticans Pini folio *C. B.*

Stœbe Plantaginis folia *Alpin. Park.*

Stratiotes Millefolia Cretica *Alpin. v.* Millefolium.

T.

Teucrium Creticum *Cluſ. Park. J. B.* Creticum incanum *C. B.* Ex ſemine è Creta miſſo Chamædryos majoris appellatione Cluſio enatum eſt.

Thlaſpi Creticum umbellatum flore albo odorato *Park.* Umbellatum Creticum flore albo odoro minus *C. B.* Parvum umbellatum flore niveo odorato *J. B.*

Thlaſpi clypeatum arboreſcens Creticum *Alpin. exot. Park.* Qu. An non idem ſit cum Thlaſpi fruticoſo altero *Lob.* aut fruticoſo folio Leucoii marini minoris *J. B.*

Thymbra *v.* Satureia.

Thymbra *Alp. exot.* Cretica vera Alpino *Park.*

Tithymalus cypariſſias Creticus *Alpin. exot.*

Tithymalus arboreus *Alpin.* Dendroides ex codice Cæſareo *Lugd. Dod.* In hort. Reg. Pariſ. colitur, & pro diſtincta à Tithymalo Dendroide Matthioli ſpecie in *Schol. Bot. Par.* ponitur.

Tithymalus maritimus ſpinoſus *C. B.* Maritimus Creticus ſpinoſus *Park.* An Tithymalus ſpinoſus Creticus *Alpin.*

Tragacantha altera ſeu Poterium denſiùs ramificatum *Alpin. exot.*

Tragacantha humilior floribus luteis *C. B.* Tragacantha *Alpin. exot.*

Tragacantha Cretenſis aut Idæa nigra, tota echinata *Moriſ.* Tragacantha altera *Alpin. exot.*

Tragacantha humilior & ſpinoſior *v.* Echinus.

Tragacantha quarta ſeu Spartium ſpinoſum alterum *Alpin. exot.* Nec flores nec fructum hujus plantæ vidit Alpinus, proinde ad quod genus referenda ſit certò nequit definiri.

Tragoriganum Creticum *C. B. Park.* Cretenſe *Ger.* Quibuſdam nigrius folio duro, flore purpureo *J. B.*

Trifolium

Trifolium ſpinoſum Creticum *C. B. Cluſ. Park. Ger. emac.* Aculeatum Creticum *J. B.* Ὀρεινόκοπτο Cretenſibus *Bell.*

Trifolium peltatum Creticum *C. B. J. B.* Odoratum peltatum Creticum *Park.* Ruſticis Cretenſibus Μαϛιχιὰϛ *Bell.*

Trifolium falcatum Creticum *Alpin. exot.* Anthyllis falcata Cretica *Park.*

V.

Valeriana Cretica tuberoſa *Park.* Nardus montana Cretica *Alpin. exot.* Nardus Cretica *Belli.* q. *v.* Nardus.

Viſcaria Cretica Maxima Alpini *v.* Lychnis.